GC 测定消炎止痒酯中樟脑的含量

蔡建红, 张咏梅, 施元旦(张家港市中医医院, 江苏 张家港 215600)

摘要: 目的 建立 GC 测定消炎止痒酯中樟脑的含量。方法 采用毛细管气相色谱法。色谱柱为 CP-Sil 5 CB 石英毛细管色谱柱(25 m×0.32 mm, 0.4 μm); FID 火焰离子化检测器; 载气为氮气; 氢气与氮气的流量比通常为 1:1~1:1.5; 氢气和空气流量比为 1:10; 流速: 1 mL·min⁻¹; 分流比: 20:1; 温度设置: 进样口温度为 250 °C, 柱温为 280 °C(程序升温:

作者简介: 蔡建红, 女, 主管药师 Tel: 13862227240 E-mail: 1306576382@qq.com

从 60 °C 开始, 保持 1 min, 再以 12 °C·min⁻¹ 的速度升温至 280 °C, 保持 3 min), 检测器温度为 300 °C; 进样量: 1 μL。
结果 樟脑在 50~400 mg·L⁻¹ 内呈现良好的线性关系, $r=0.999\ 9$; 平均回收率为 99.64%(RSD 为 1.19%); 在 6 h 内稳定。
结论 本方法简单易行、快速、准确性和重复性好, 可用于消炎止痒酊的质量控制。

关键词: 气相色谱法; 消炎止痒酊; 樟脑; 含量测定

中图分类号: R917.101

文献标志码: B

文章编号: 1007-7693(2012)05-0446-04

Determination of Camphor in Xiaoyanzhiyang Xu by GC

CAI Jianhong, ZHANG Yongmei, SHI Yuandan(*Zhangjiagang City Hospital of Chinese Medicine, Zhangjiagang 215600, China*)

ABSTRACT: OBJECTIVE To establish a method for determine camphor in Xiaoyanzhiyang Xu by GC. **METHODS** Use capillary gas chromatography. Chromatographic column is CP-Sil 5 CB quartz chromatographic column(25 m×0.32 mm, 0.4 μm); FID flame ionization detector; carrier gas is nitrogen; usually specific flux of hydrogen and nitrogen is 1:1~1:1.5; flow ratio of hydrogen and air is 1:10; velocity of flow: 1 mL·min⁻¹; split ratio: 20:1; temperature setting: sampling input temperature 250 °C; column temperature 280 °C(temperature programming process: start from 60 °C, retain 1 min, achieve 280 °C by temperature rising speed 12 °C·min⁻¹, retain 3 min); detector temperature 300 °C; sample size: 1 μL. **RESULTS** The linear range of Camphor was 50~400 mg·L⁻¹, $r=0.999\ 9$; the recovery of Camphor was 99.64%(RSD=1.19%) and it was stable in 6 hours. **CONCLUSION** The method is simple and easy, fast, accurate and repeatable. It can be used as quality control method for Xiaoyanzhiyang Xu.

KEY WORDS: gas chromatography(GC); Xiaoyanzhiyang Xu; camphor; determination

消炎止痒酊是张家港中医医院自制制剂, 是由樟脑、香精、甘油、乙醇等制备而成的酊剂。主要用于夏季皮炎、痱子、虫咬皮炎等皮肤瘙痒症。其原有的质量标准中没有含量测定项, 本实验采用气相色谱法测定其中的挥发性成分樟脑, 以有效控制该药的质量标准, 更好地指导临床安全用药。本试验建立的方法简便、快速、稳定、可靠, 为测定消炎止痒酊中樟脑的含量提供了一定的参考。

1 仪器和试剂

1.1 仪器

美国 VARIAN CP-3800 气相色谱仪; 氢火焰离子化检测器(FID); 日本岛津 SHIMADZU 电子天平。

1.2 试剂

樟脑对照品(中国药品生物制品检定所, 批号: 110747-201008, 纯度: 100%); 消炎止痒酊(张家港市中医医院制剂室制备, 批号: 100424, 100922, 110118); 水为重蒸馏水, 其他试剂均为分析纯。

2 方法与结果

2.1 色谱条件

参考有关文献^[1], 结合样品中成分的特点, 确定色谱条件如下: 色谱柱: CP-Sil 5 CB(100%二甲基聚硅氧烷)石英毛细管色谱柱, 25 m×0.32 mm,

0.4 μm; 氢气与氮气的流量比通常为 1:1~1:1.5; 氢气和空气流量比为 1:10; 载气: N₂; 流速: 1 mL·min⁻¹; 分流比: 20:1; 检测器: FID 火焰离子化检测器; 温度设置: 进样口温度为 250 °C, 柱温为 280 °C(程序升温: 从 60 °C 开始, 保持 1 min, 再以 12 °C·min⁻¹ 的速度升温至 280 °C, 保持 3 min), 检测器温度为 300 °C; 进样量: 1 μL。

2.2 溶液的制备

2.2.1 对照品溶液的制备 取樟脑对照品, 精密称定 10.00 mg, 置 10 mL 量瓶中, 加无水乙醇溶解并稀释至刻度, 摇匀, 作为对照品溶液。

2.2.2 供试品溶液的制备 精密量取本品 1 mL, 置 25 mL 量瓶中, 用无水乙醇稀释至刻度, 摇匀, 作为供试品溶液。

2.2.3 阴性对照溶液的制备 按处方组成比例, 取除樟脑外的其余药品, 按工艺要求, 制成不含樟脑的阴性对照样品, 再按“2.2.2”项下方法制备, 制成阴性对照溶液。

2.3 专属性试验

按“2.1”项下色谱条件, 分别进样对照品溶液、供试品溶液、阴性对照溶液各 1 μL。供试品中樟脑成分得到较好分离, 樟脑色谱峰的保留时间与对照品溶液中樟脑的保留时间一致, 阴性对照溶液色谱图中未见樟脑色谱峰。色谱图见图 1。

图1 气相色谱图

A-对照品溶液; B-供试品溶液; C-阴性对照溶液; 1-樟脑

Fig 1 GC chromatograms

A-reference solution; B-test solution; C-negative control solution; 1-Camphor

2.4 线性关系考察

分别精密量取樟脑对照品溶液(浓度为 $1\ 000\ \text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$) 0.5, 1, 2, 3, 4 mL, 置 10 mL 量瓶中, 加入无水乙醇稀释至刻度, 摇匀, 即得系列浓度溶液, 浓度分别为 50, 100, 200, 300, $400\ \text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$ 。各吸取上述溶液 $1\ \mu\text{L}$ 进样测定, 测出各浓度水平对应的峰面积分别为 23 260, 44 938, 94 076, 142 093, 191 274, 以樟脑的峰面积为纵坐标, 浓度为横坐标, 绘制标准曲线, 得到的回归方程为 $Y=-2\ 094.079+482.011X$, $r=0.999\ 9$, 表明樟脑进样浓度在 $50\sim 400\ \text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$ 内线性相关性良好。

2.5 仪器适应性试验

取“2.2.1”项下制备的对照品溶液 2 mL, 置 10 mL 的量瓶中, 加入无水乙醇稀释至刻度, 摇匀, 即得 $200\ \text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$ 的对照品溶液, 连续进样 6 次, 测得的峰面积分别为 94 076, 96 278, 93 704, 92 895, 94 286, 97 306, 平均峰面积为 94 758, RSD 为 1.78%, 表明仪器适应性良好。

2.6 稳定性试验

按“2.1”项下色谱条件, 取同一供试品溶液间隔一段时间(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 h)进样 6 次, 每次进样 $1\ \mu\text{L}$, 测得樟脑峰面积分别为 81 588, 82 975, 83 030, 83 831, 84 102, 85 047, RSD 为 1.38%, 结果表明, 供试液在 6 h 内稳定。

2.7 重复性试验

取同一批号(100424)消炎止痒酯样品, 按“2.2.2”项下方法制成 6 份供试品溶液, 按“2.1”项下色谱条件分别进样测定, 供试品中樟脑的含量分别为 172.30, 178.61, 175.34, 175.23, 176.95, $175.87\ \text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$, 结果供试品中樟脑的平均含量为 $175.7\ \text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$, RSD 为 1.19%, 表明本方法重复性良好。

2.8 加样回收率试验

精密移取已知含量样品(批号为 100424) 6 份, 每份 0.5 mL(2.507 mg), 分别置 25 mL 量瓶中, 分别精密加入樟脑对照品溶液 0.8, 1.0, 1.2 mL, 用无水乙醇定容, 摇匀, 按样品测定方法测定其含量, 计算回收率, 结果见表 1。

表 1 加样回收率试验结果($n=6$)

Tab 1 Results of recovery test($n=6$)

序列	样品含量 /mg	加入对照 品量/mL	测得量/ mg	回收率/ %	平均回 收率/%	RSD/ %
1	2.507 0	0.800 0	3.300 2	99.15	99.64	1.19
2	2.507 0	0.800 0	3.311 6	101.20		
3	2.507 0	1.000 0	3.504 7	99.77		
4	2.507 0	1.000 0	3.505 7	99.87		
5	2.507 0	1.200 0	3.709 4	100.20		
6	2.507 0	1.200 0	3.678 8	97.65		

2.9 样品测定

按“2.2.2”项下方法分别制备 3 个批号(100424, 100922, 110118)供试品溶液, 按“2.1”项下色谱条件依次进样, 进样量为 $1\ \mu\text{L}$, 测定每一供试品溶液樟脑的含量, 结果见表 2。

表 2 样品测定结果($n=2$)

Tab 2 Determination results of samples($n=2$)

批号	樟脑/ $\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$	RSD/%
100424	4 345.0	0.7
100922	4 392.5	
110118	4 405.0	

3 讨论

3.1 稀释溶剂的选择

经查阅相关的文献^[2], 樟脑易溶解于乙醇、三氯甲烷、乙醚, 而无水乙醇最为普遍, 所以采用无水乙醇为稀释溶剂。

3.2 色谱温度程序的选择

色谱条件的柱温选择是色谱峰分离的一个重

要参数,直接影响分离效果和分离速度^[3]。文献中测定樟脑的含量多采用程序升温的方法^[4],采用程序升温法更有利于各组分的分离。根据实验表明,将柱温调到 280 °C(程序升温程序:从 60 °C 开始,保持 1 min,再以 12 °C·min⁻¹的速度升温至 280 °C,保持 3 min)时,樟脑与其他成分的色谱峰均达到较好分离,故确定本品含量测定用柱温为 280 °C。

3.3 稳定性试验

实验表明,配制好的樟脑对照品溶液及樟脑供试品溶液在 6 h 内可基本保持稳定,所以溶液配制好后,分析测试工作应在 6 h 内完成为宜。

3.4 外标法的确定

由于 GC 的进样量一般仅数微升,为减小进样误差,尤其当采用手工进样时,由于留针时间和室温等对进样量也有影响,故以采用内标法为宜,且根据参考文献^[5-6],内标法测定结果更准确。但是,当采用自动进样器时,由于进样重复性的提高,在保证分析误差的前提下,也可采用外标法定量^[7]。由于采用的 VARIAN CP-3800 气相色谱仪为自动进样,因此采用外标法。

3.5 结果分析

由结果可知,不同批号供试品中樟脑的含量存在差异。结合样品批号和测定结果初步判断,随着样品贮藏时间的增加,样品中樟脑含量会发生变化。分析原因,樟脑原料的贮藏、消炎止痒

酯生产工艺各环节及成品贮藏条件都会影响产品中樟脑的含量。

由于消炎止痒酯原有的质量标准没有含量测定项,为了提高本品的质量标准,保障临床用药安全有效,通过本试验建立的方法简便、快速、稳定、可靠,为测定消炎止痒酯中樟脑的含量提供了一定的理论依据。

REFERENCES

- [1] WANG T L, ZHU G J. Determination of camphor and menthol in Huoluo tincture by GC [J]. China Tradit Pat Med(中成药), 2010, 32(9): 1644-1646.
- [2] BI X Y, ZHAO Z L, LANG X L, et al. HPLC determination of the content of benzoic acid and camphor in compound benzoic acid tincture [J]. Pharm J PLA(解放军药理学学报), 2007, 23(6): 452-454.
- [3] LI F M. Analytical Chemistry(分析化学) [M]. 5th ed. Beijing: People's Health Publishing House, 2005: 404.
- [4] ZHOU G, WANG J C, YU F Y, et al. Capillary GC determination of menthol and camphor in compound menthol nasal drops [J]. Pharm J PLA(解放军药理学学报), 2006, 22(2): 150-152.
- [5] HUANG W Q, HUANG W F. Capillary GC determination of the three components of content in Qufeng oil [J]. J Chin Med Mater(中药材), 2007, 30(9): 1167-1169.
- [6] CHEN Z M. Determination of camphor in Suantong spray by GC [J]. Drug Stand China(中国药品标准), 2009, 10(5): 374-376.
- [7] Ch.P(2005)Vol I (中国药典 2005 年版. 一部) [S]. 2005: 37-38.