

草木犀流浸液片致过敏性休克 1 例

金雪, 寿张轩* (浙江省人民医院, 杭州 310014)

中图分类号: R994.11

文献标志码: A

文章编号: 1007-7693(2015)06-0756-01

DOI: 10.13748/j.cnki.issn1007-7693.2015.06.030

1 病例资料

患者, 女, 25 岁, 2014 年 11 月 6 日因车祸致左膝外侧疼痛肿胀, 活动受限入院, 初步诊断为左膝前十字韧带断裂。入院查体发现, 体温: 36.5 °C, 脉搏: 75 次·min⁻¹, 呼吸: 20 次·min⁻¹, 血压: 100/70 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa), 患者既往无食物、药物过敏史。病程中无四肢抽搐、无口吐白沫, 血常规及其他指标均正常。给予草木犀流浸液片(消脱止-M, 日本生晃荣养药品株式会社, 批号: ST-A144)100 mg, 3 次·d⁻¹, po。约 30 min 后, 患者出现突然晕厥, 全身抽搐, 面色苍白。查体发现, 血压: 70/50 mmHg, 脉搏: 118 次·min⁻¹, 考虑为过敏性休克。遵医嘱立即停药, 同时给予氧气吸入, 予盐酸肾上腺素注射液 1 mg, sc, 地塞米松磷酸钠注射液 5 mg, iv, 10%葡萄糖注射液 10 mL+50%葡萄糖注射液 20 mL, ivvp, 患者病情立即好转, 5 min 后面色红润, 生命体征平稳, 恢复清醒。停用草木犀流浸液片后, 患者住院期间未再发生过敏现象。

2 讨论

本例为患者口服草木犀流浸液片后出现的过敏反应, 而同一时期该院其他患者使用(同一厂家同一批号)草木犀流浸液片并未发生任何异常, 故排除药品质量问题。该患者发生不良反应时只用了草木犀流浸液片, 用药 30 min 后出现不良反应, 与过敏反应出现有比较合理的时间关系, 根据诺氏(Naranjo'S)评估量表, 最终得分为 8 分, 故可判定该不良反应很可能为草木犀流浸液片所致。

草木犀流浸液片为黄花草木犀(*Melilotus officinalis*)的流浸液提取物。主要含有香豆素类、

酚酸类、黄酮类和三萜皂苷类以及脂肪油类等多种化合物。草木犀流浸液片中含有的香豆素不同于具有强力抗凝血作用的羟基香豆素, 其主要成分是香豆素酸, 不至于造成血液凝血因子以及凝血过程的异常变化。其主要作用为: ①降低由于各种原因(创伤、骨折、劳损、组织缺氧、手术等)造成的血管壁通透性增高, 增强毛细血管强度, 抑制血清蛋白损失, 维持正常胶体渗透压, 减少渗出, 从而起到抗水肿的作用; ②增强血管强度和弹性, 改善动脉、静脉血流量, 促进血液循环及增加血液流量, 从而预防和治疗静脉曲张、静脉炎等静脉功能不全; ③扩张淋巴管, 增加淋巴液流量, 促进淋巴循环, 从而减轻淋巴循环障碍引起的软组织浮肿; ④预防和治疗血栓和栓塞的形成; ⑤有效抑制炎症质合成和释放, 缓解炎症反应程度, 有明显消炎镇痛作用。

近年来, 国内外对草木犀提取物的药理作用进行了深入研究, 涉及到消炎镇痛、抗水肿、减轻软组织水肿、预防和治疗血栓和栓塞的形成、利尿作用、免疫调节、抗氧化、清除自由基作用等。其国内临床应用也涉及到治疗痔、皮肤擦伤、外伤性软组织肿胀、慢性下肢静脉功能不全、腰椎间盘突出神经根炎症水肿及辅助治疗急性脑梗死等方面。药品说明书不良反应项表述: “至今为止未发现明显不良反应”, 文献检索也未发现相关不良反应报道, 本次不良反应很可能与患者个体差异有关。笔者在此提醒厂家, 应及时修改该药品说明书不良反应项, 为临床安全用药提供参考。

收稿日期: 2015-02-13

作者简介: 金雪, 女, 副主任药师 Tel: 13967160368 E-mail: jinxue1970@126.com
13588173827 E-mail: shousor@126.com

*通信作者: 寿张轩, 男, 副主任药师 Tel: