JNK 信号通路与胰岛 β 细胞凋亡

马平^{1,2}, 张吟^{1*} (1.福建医科大学附属第二医院药学部, 福建 泉州 362000; 2.福建医科大学药学院, 福州 350000)

摘要: c-Jun 氨基端激酶(c-Jun N-terminal kinase, JNK)信号通路是近几年发现的与细胞凋亡机制、应激反应以及糖尿病发生与发展关系密切的通路之一, 其生物学效应对胰岛 β 细胞的调节至关重要。根据刺激源的不同, JNK 会介导 3 条凋亡通路的激活, 包括死亡受体通路、线粒体凋亡通路以及内质网应激通路, 各通路之间以某个因子或刺激源而产生串扰关系。活性氧作为应激源可以激活 JNK 信号通路, 从而激活相关凋亡通路。因此, 对 JNK 信号通路的各个节点进行调控, 极有可能减少胰岛 β 细胞凋亡数量, 保护胰腺组织完整性, 降低糖尿病及并发症的风险。

关键词: c-Jun 氨基端激酶; 凋亡; 活性氧; 线粒体凋亡; 内质网应激

中图分类号: R969.2 文献标志码: A 文章编号: 1007-7693(2018)06-0942-05

DOI: 10.13748/j.cnki.issn1007-7693.2018.06.035

引用本文: 马平, 张吟. JNK 信号通路与胰岛 β 细胞凋亡[J]. 中国现代应用药学, 2018, 35(6): 942-946.

JNK Signaling Pathway and Islet Beta Cell Apoptosis

MA Ping^{1,2}, ZHANG Yin^{1*} (1.Department of Pharmacy, The Second Affiliated Hospital of Fujian Medical University, Quanzhou 362000, China; 2.School of Pharmaceutical, Fujian Medical University, Fuzhou 350000, China)

ABSTRACT: c-Jun N-terminal kinase(JNK) signaling pathway is found in recent years and is one of the pathways of closely related to mechanism of cell apoptosis, shock response as well as the occurrence and development of diabetes, which its biological effect is important for the regulation of islet beta cells. According to different stimuli, the JNK is mediated three activation of apoptotic pathways, including death receptor pathway, mitochondrial apoptosis pathway and endoplasmic reticulum stress activation pathway, between various pathways to a factor or stimuli and produce crosstalk relationship. Reactive oxygen species (ROS) as a source of stress can activates JNK signaling pathway, so then excited apoptosis pathway. Therefore, to adjust and control on every node of the JNK signaling pathway, which are likely to reduce the number of islet beta cell apoptosis, protect pancreatic tissue integrity, reduce the risk of diabetes and complications.

KEY WORDS: c-Jun N-terminal kinase; apoptosis; reactive oxygen species; mitochondrial apoptosis; endoplasmic reticulum stress

近年来, 糖尿病患者日趋增多, 且随着糖尿病患者病程的持续, 其胰岛 β 细胞数量逐渐减少, 胰岛 β 细胞功能呈进行性下降。细胞凋亡是胰岛 β 细胞数量减少的最终形式, 而胰岛 β 细胞衰竭所致的胰岛素分泌不足是血糖升高的主要原因, 这表明调节胰岛 β 细胞衰竭机制是治愈 2 型糖尿病的关键。c-Jun 氨基端激酶(c-Jun N-terminal kinase, JNK)作为一类促凋亡激酶, 参与了死亡受体通路、线粒体凋亡通路、内质网通路及氧化应激介导的胰岛 β 细胞凋亡。由此, JNK 信号通路可作为调控胰岛 β 细胞凋亡的一个重要节点, 选择性抑制 JNK 的活性或抑制 JNK 上下游某个信号分子, 极有可能为糖尿病在临床上的治疗提供一个新途径。

1 JNK 的结构和活性调节

1.1 JNK 的结构

JNK 属于丝裂原活化蛋白激酶(mitogen-

activated protein kinases, MAPKs)超家族^[1], 对细胞的生长、分化和凋亡具有调节作用。JNK 具有 JNK1、JNK2 和 JNK3 3 种分子形式, 分别由 MAPK8、MAPK9 和 MAPK10 基因编码, 隶属丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶。JNK1 和 JNK2 在机体内诸多组织中广泛表达, 而 JNK3 仅存在于脑、心脏、睾丸中。另外, 应激状态下 JNK1 优先磷酸化 c-jun, 调高 JNK 转录活性, 激活应激通路; 而 JNK2 仅仅在正常情况下表达。

1.2 JNK 活性调节

一般而言, JNK 定位于胞浆, JNK 信号通路通过三级酶促级联反应而激活, 即 MAPK 激酶的激酶(MAPK kinase kinase, MAPKKK)-MAPK 激酶(MAPK kinase, MAPKK)-MAPK^[2]。当细胞受到高糖高脂、炎症、镉等重金属离子、G-蛋白耦联受体以及胰岛淀粉样多肽^[3]等外界刺激后,

基金项目: 福建省卫生系统中青年骨干人才培养项目(2015-ZQN-ZD-23)

作者简介: 马平, 女, 硕士生 Tel: 18046044090 E-mail: 1078693909@qq.com *通信作者: 张吟, 女, 博士, 副教授 Tel: (0595)22775021 E-mail: zysin1973@163.com

MAPKK 通过双磷酸化 JNK Ⅷ区苏氨酸 Thr-183、酪氨酸 Tyr-185 位点激活 JNK。活化的 JNK 与 c-Jun 氨基末端结合后转移至细胞核，使后者磷酸化增强，促进了基因表达和蛋白质合成，发挥相应的生物学效应^[4]。除此之外，JNK 还能激活核内其他转录因子，如 c-myc、基质金属蛋白酶 Ets 相似蛋白(ELK-1)、转录激活因子 2(ATF-2)、p53 等，进一步的研究发现还包括细胞质中的凋亡调节蛋白 Bcl-2、Bcl-xL、Bim、BAD 等。在大多数情况下，JNK 发挥促凋亡作用。

2 JNK 信号通路与细胞凋亡

细胞凋亡是基因调控下细胞正常的死亡过程。JNK 信号通路作为调节细胞凋亡的一个重要节点，在细胞凋亡过程中发挥重要作用。应激情况下，JNK 能介导各种细胞外刺激诱导的细胞凋亡，并参与多种细胞凋亡的过程，因此与多种疾病有着直接或间接的联系。

在阿尔兹海默症患者脑内，会出现异常增多的老年斑，其主要成分是 β 淀粉样蛋白，可以直接激活 JNK 诱导神经细胞死亡^[5]；与正常细胞相比，在霍奇金淋巴瘤细胞中 JNK 的活性会明显升高，这说明 JNK 可能与肿瘤的形成有很大关联，其机制可能与 JNK 的激活促进细胞增殖有关^[6]；JNK 在促进心肌细胞凋亡过程中主要是激活线粒体途径介导细胞凋亡^[7]；而 JNK 对肝细胞的促凋亡作用，不仅激活了线粒体途径，还激活了死亡受体途径^[8]；JNK 对胰岛 β 细胞的促凋亡机制主要有 2 种，一种是通过死亡受体途径上调促凋亡蛋白的表达；另一种是作用于线粒体途径。

3 JNK 信号通路与胰岛 β 细胞凋亡

研究表明，JNK 能多途径调节胰岛 β 细胞的功能^[9]。如细胞因子白介素-1(IL-1 β)可特异性激活 JNK 信号通路，造成胰岛 β 细胞死亡^[10]，其中，JNK 的激活具有钙离子(Ca²⁺)依赖性。除此之外，JNK 对氧化应激也具有调节介导作用。在糖尿病小鼠中，自由基聚集诱发的氧化应激可激活 JNK 信号通路，诱使胰岛素基因转录因子(PDX-1)转移至胞浆抑制其表达，使用 JNK 抑制剂 SP600125 可使 JNK 活性降低。

目前，JNK 介导 β 细胞凋亡的信号通路有 3 条：一是通过调节下游凋亡相关蛋白的表达而介导的死亡受体途径；二是通过直接调节细胞质内凋亡蛋白家族的活性(如 BH-3 only, Bcl-2 等)而介导的线粒体途径；三是通过内质网未折叠蛋白反

应而介导的内质网应激(endoplasmic reticulum stress, ERS)凋亡途径。表面上这 3 条信号通路是分开的，事实上这 3 条信号通路并不完全独立，它们之间通过特定的分子进行交流。

3.1 死亡受体途径：JNK→Fas/FasL→caspase-8→ β 细胞凋亡

活化后的 JNK 会激活死亡配体 FasL，并与受体 Fas 结合，促使 caspase-8 前体(半胱天冬酶 8)断裂并激活，从而启动 caspase 家族促凋亡级联反应，启动死亡受体通路^[11]，见图 1。与传统观点相悖的是 Fas/FasL 结合干预并不参与 NOD 小鼠糖尿病过程；据报道^[12]，细胞内 Fas/FasL 结合干预具有凋亡时限性，早期凋亡发挥防御功能，晚期凋亡发挥致死性作用。有研究表明^[13]，在胰淀素转基因胰岛中，使用 JNK 抑制剂后 Fas 和 Fadd mRNA 水平分别减少 74%和 48%，这说明 JNK 对死亡受体途径的调节至关重要。IL-1 β 介导 HIAPP 引起 Fas 上调，激活 caspase-8 诱导 β 细胞凋亡，这表明 caspase-8 是死亡受体通路激活的必经之路^[14]。

图 1 JNK 介导的死亡受体途径

Fig. 1 JNK mediated death receptor pathway

Fas 不仅是 JNK 的作用位点，也是 NF- κ B 的靶基因位点。和其他类型细胞相比，NF- κ B 在胰岛 β 细胞中发挥促凋亡效应。核转录因子 NF- κ B 在细胞因子集合干扰下，通过上调死亡受体 Fas 启动死亡受体途径诱导 β 细胞凋亡。其中，IL-1 β 比 TNF- α 更快激活 NF- κ B，胰岛 β 细胞比其他细胞更早地激活 NF- κ B，通过调节下游相关死亡受体的表达介导 β 细胞凋亡^[15]。

3.2 线粒体凋亡途径：JNK→Bim→Bax→Cyt-C→caspase-9→caspase-3→细胞凋亡

线粒体具有类似发电站的强大功能，不仅是细胞能量和代谢的中心，同时又参与细胞氧化损伤。在不同刺激源的干预下，活化的 JNK 可作用

于下游凋亡相关蛋白引起线粒体不同程度的损伤。细胞质中活化的 JNK 可进入细胞核激活 c-Jun、p53 等转录因子诱导胰岛 β 细胞凋亡；也可以通过直接磷酸化 Thr167 位点^[16]，或者直接激活 Bax，活化的 Bax 从细胞质迅速转入到线粒体外膜使其通透性转变孔过度开放，造成 Cyt-C、线粒体促凋亡蛋白(Smac)等促凋亡因子释放至细胞质与凋亡诱导因子结合变为 Cyt-C-Apaf1- procaspase-9 凋亡体复合物，触发 caspase 级联反应，诱导胰岛 β 细胞的凋亡。Bax 是线粒体途径中的重要促凋亡蛋白，同时也是一个可抑制靶点^[17]，见图 2。

图 2 JNK 介导的线粒体途径
Fig. 2 JNK mediated mitochondrial pathway

在高糖作用下，胰岛 β 细胞系 RIN-5F 细胞中促炎性因子表达上升，活性氧(reactive oxygen species, ROS)浓度增高，Bax 磷酸化表达增强诱导细胞凋亡^[18]。近些年对 Bcl-2/Bax 凋亡蛋白比例的研究不断深入，据报道^[19]，当凋亡蛋白的比例接近于 1 时，提示蛋白表达处于相对平衡，细胞处于存活状态；当凋亡蛋白的比例 <1 时，提示蛋白表达处于激活状态，细胞进入凋亡状态。在胰岛 β 细胞系 MIN6 细胞中，高糖和铁浓度上升后会引起 Bcl-2/Bax 比例下降，引起细胞凋亡数量增多^[20]。GLP-1 类似物在 STZ 诱导或高糖刺激下通过下调 Bcl-2/Bax 比例缓解细胞凋亡^[21]。

3.3 ERS 反应性凋亡途径：ERS $\rightarrow$ CHOP，IRE1-JNK，caspase-12 $\rightarrow$ 细胞凋亡

3.3.1 ERS ERS 一般指细胞受到外界刺激因素刺激后内环境发生紊乱的一种病理状态。适度的 ERS 会改善内质网稳态，过度的 ERS 会引起内质网内环境紊乱，促进 β 细胞凋亡增多，从而触发糖尿病的发生、发展。

3.3.2 ERS 通路 β 细胞具有高度发达的内质网，对应激压力尤为敏感。一般情况下，内质网跨膜

蛋白内质网肌醇需求激酶 1(inositol- requiring enzyme-1, IRE1)、双链 RNA 依赖性蛋白激酶样内质网激酶(PRKR-like endoplasmic reticulum kinase, PERK)、激活转录因子 6 (activating transcription factor 6, ATF6)、N 末端与分子伴侣重链结合蛋白(immunoglobulin heavy chain binding protein, Bip)连接，正常处于未激活状态，可以感知 ERS 信号并将其传入胞质和胞核，使细胞在应激下得以生存。细胞受到外界刺激后，Bip 与跨膜蛋白分离，并与 UPR 连接，通过触发 ERS 通路诱导胰岛 β 细胞凋亡。据报道，ATF6 可能具有抗凋亡作用^[22]。细胞中 ATF6 基因敲除后，细胞内 UPR 信号强度增加，缓解应激的同时胰岛 β 细胞数量增加，说明 ATF6 很可能是一个重要的抑制靶点^[23]。

ERS 时，C/EBP 同源蛋白(C/EBP homologous protein, CHOP)表达增强，通过调节 Bcl-2 蛋白以及 ROS 介导 β 细胞凋亡^[24]。CHOP 诱导表达的内质网氧化物蛋白(endoplasmic oxidoreductin1 like protein, ERO1 α)能激活内质网钙离子通道，使钙离子释放至胞浆增多，钙离子作为应激因素通过调节 Bcl-2 蛋白介导胰岛 β 细胞凋亡^[25]；这提示 Bcl-2 凋亡蛋白介入 ERS CHOP 通路的原因可能是钙离子过度释放。另外，ERS 诱导 CHOP 及下游靶基因 ERO1 α 的高表达，会使内质网腔呈高度氧化状态，诱发一系列炎症反应介导胰岛 β 细胞凋亡^[26]。过度的 ERS 通过激活 IRE1，诱使 caspase-12 磷酸化激活，最终引起 β 细胞凋亡^[27]；此外，活化的 IRE1 也可结合 TRAF2 或形成 IRE1-TRAF2-ASK1 复合物从而激活 JNK 信号通路介导胰岛 β 细胞凋亡。IRE1 α 基因被敲除后^[28]，JNK 磷酸化水平下降，提示 IRE1 α 是 JNK 信号通路激活必不可少的因素之一。泛素 D(UBD)可以调节 IRE1 α - JNK 通路，作为一种负反馈信号调控 IRE1 α - JNK，减少 JNK 磷酸化，减少胰岛 β 细胞凋亡，发挥抗凋亡作用^[29]。在胰岛素抵抗小鼠模型中，持续的高糖高脂通过增强 CHOP 表达及激活 IRE1 α -JNK 信号通路诱导 β 细胞凋亡。

在胰岛 β 细胞凋亡过程中，caspase-3 作为 ERS 通路的活化终点，提示 ERS 激活信号很可能被传递到线粒体上，说明内质网通路和线粒体通路在诱导 β 细胞凋亡过程中可能存在一定联系。ERS 通路和线粒体凋亡通路在介导 β 细胞凋亡时表面上互不依赖，事实上在介导 β 细胞凋亡过程中会

产生“串扰”现象。有很多实验现象表明^[30]，在细胞凋亡的早期，细胞质中钙离子的持续升高会激活 JNK，活化的 JNK 通过磷酸化 Bax 诱导 β 细胞凋亡。同时，活化的 JNK 会进一步促进钙离子释放，引起线粒体膜通透性增加，从而激活线粒体凋亡通路^[31]；另外，钙离子浓度升高会直接激活 ERS 通路，通过 caspase-12 和 CHOP 2 条路径共同介导 β 细胞凋亡^[32]。钙离子作为线粒体单向传递体在 ERS 通路和线粒体凋亡通路之间穿梭，虽然这 2 个器官之间交流的具体成分并不清楚，但钙离子似乎是联系这 2 个器官交流的重要靶点。提示钙离子可能是连接内质网通路和线粒体通路的重要中枢。ERS 诱导 β 细胞凋亡通路见图 3。

图 3 ERS 诱导 β 细胞凋亡通路
Fig. 3 ERS induces beta cell apoptosis pathway

4 JNK 介导的氧化应激途径

ROS 族作为线粒体产能的重要原料，与细胞凋亡密切相关。糖尿病状态下，高血糖、糖基化终末产物通过酶或非酶途径使自由基产生增多，诱发氧化应激^[33]。氧化应激一般可通过凋亡信号调节激酶 1 (apoptosis signal-regulating kinase 1, ASK1)、Src 酪氨酸激酶等蛋白通路激活 JNK，活化的 JNK 通过招募 TRAF2 与信号转导及转录激活蛋白 (signal transducer and activator of transcription 3, STAT3) 造成线粒体氧化损伤，增加线粒体细胞膜通透性，激活 caspase 级联反应介导 β 细胞凋亡^[34]。其中，STAT3 是一种重要的抗凋亡因子，STAT3 缺失的小鼠对氧化应激更为敏感，凋亡率更高。研究表明，氧化应激引起的 JNK 活化可调节细胞中增强子结合蛋白 (4EBP-1) 的表达和磷酸化，有研究发现^[35]增加 4EBP-1 活性会促进 β 细胞在氧化应激下的存活，此过程有 IRS- PI3 K-Akt-mTOR 通

路的参与。另外，JNK 信号通路还可以介导 Toll 样受体 4 (toll like receptor 4, TRL4) 途径发挥促凋亡作用。Shen 等^[36]的研究表明，胰岛 β 细胞在棕榈酸 (palmitic acid, PA) 干预下可通过 TRL4 依赖途径激活 JNK，诱导 β 细胞凋亡，使用 JNK 抑制剂可降低 JNK 表达，同时抑制 PA 诱导的细胞凋亡。说明 TRL4-JNK 信号通路也是诱导胰岛 β 细胞凋亡的一个重要途径。JNK 介导的氧化应激通路见图 4。

图 4 JNK 介导的氧化应激通路
Fig. 4 JNK mediated oxidative stress pathway

5 结语

目前，对 JNK 信号通路介导细胞凋亡的研究愈来愈深，越来越多的 JNK 调节因子和下游作用底物也相继出现，这使人们对 JNK 的认识又更深一步，在病理研究中奠定了良好的基础作用。细胞内 JNK 的活化既是一种生长信号，也是一种促凋亡信号，而决定细胞最终命运的是 JNK 被何种上游刺激源激活以及与何种下游分子结合作为底物。在细胞凋亡中，JNK 介导的凋亡机制和途径也不一样，如在调节神经、肝、癌细胞凋亡中，有的可激活死亡受体途径，有的会激活线粒体途径。JNK 对与细胞凋亡有直接或间接关系的疾病具有重要调节作用，因此需要更深入探究 JNK 信号通路及疾病的发生机制，从而提供更多治疗方法。

REFERENCES

- [1] COUTO D, FREITAS M, PORTO G, et al. Polyacrylic acid-coated and non-coated iron oxide nanoparticles induce cytokine activation in human blood cells through TAK1, p38 MAPK and JNK pro-inflammatory pathways [J]. Arch Toxicol, 2015, 89(10): 1759-1769.
- [2] TOMITA T. Apoptosis in pancreatic β -islet cells in Type 2 diabetes [J]. Bosn J Basic Med Sci, 2016, 16(3): 162-179.

- [3] WANG J, PAN C, WANG Y, et al. Genome-wide identification of MAPK, MAPKK, and MAPKKK gene families and transcriptional profiling analysis during development and stress response in cucumber [J]. *BMC Genomics*, 2015, 16(1): 386-406.
- [4] 江震, 沈喜妹, 杨立勇, 等. c-Jun 氨基末端激酶信号通路与胰岛 β 细胞凋亡[J]. *福建医科大学学报*, 2016, 50(5): 345-348.
- [5] AKHTER R, SANPHUI P, DAS H, et al. The regulation of p53 up-regulated modulator of apoptosis by JNK/c-Jun pathway in β -amyloid-induced neuron death [J]. *J Neurochem*, 2015, 134(6): 1091-1103.
- [6] LEVENTAKI V, DRAKOS E, KARANIKOU M, et al. c-JUN N-terminal kinase (JNK) is activated and contributes to tumor cell proliferation in classical Hodgkin lymphoma [J]. *Human Pathol*, 2014, 45(3): 565-572.
- [7] AOKI H, KANG P M, HAMPE J, et al. Direct activation of mitochondrial apoptosis machinery by c-Jun N-terminal kinase in adult cardiac myocytes [J]. *J Biol Chem*, 2002, 277(12): 10244-10250.
- [8] JIAO F, ZHANG Q, MO W, et al. Salidroside pretreatment attenuates apoptosis and autophagy during hepatic ischemia-reperfusion injury by inhibiting the mitogen-activated protein kinase pathway in mice [J]. *Drug Des Devel Ther*, 2017(11): 1989-2006.
- [9] LUNDH M, BUGLIANI M, DAHLBY T, et al. The immunoproteasome is induced by cytokines and regulates apoptosis in human islets [J]. *J Endocrinol*, 2017, 233(3): 369-379.
- [10] BROZZI F, NARDELLI T R, LOPES M, et al. Cytokines induce endoplasmic reticulum stress in human, rat and mouse beta cells via different mechanisms. [J]. *Diabetologia*, 2015, 58(10): 2307-2316.
- [11] 李岚, 王东. Fas/FasL 介导的胰岛 β 细胞凋亡的研究进展[J]. *医学综述*, 2011, 17(8): 1124-1126.
- [12] MORAGIRAL C, WONG F, PANOSA A, et al. Early overexpression of FAS in beta cells protects NOD mice from autoimmune diabetes (BA6P.119) [J]. *J Immunology*, 2015, 194(1 Suppl): 114-122.
- [13] SUBRAMANIAN S L, HULL R L, ZRAIKA S, et al. cJUN N-terminal kinase (JNK) activation mediates islet amyloid-induced beta cell apoptosis in cultured human islet amyloid polypeptide transgenic mouse islets [J]. *Diabetologia*, 2012, 55(1): 166-174.
- [14] PARK Y J, WOO M, KIEFFER T J, et al. Caspase-8 在淀粉样蛋白诱导人类和小鼠胰岛 β 细胞凋亡中的作用[J]. *中国糖尿病杂志*, 2014, 6(11): 139-140.
- [15] ORTIS F, CARDOZO A K, CRISPIM D, et al. Cytokine-induced proapoptotic gene expression in insulin-producing cells is related to rapid, sustained, and nonoscillatory nuclear factor-kappaB activation [J]. *Mol Endocrinol*, 2006, 20(8): 1867-1879.
- [16] YU D M, AN S, YANG Y, et al. The role of JNK kinase in apoptosis and its relationship with cancer [J]. *Chin Pharmacol Bull(中国药理学通报)*, 2015, 31(12): 1641-1645.
- [17] MARIMUTHU P, SINGARAVELU K. Deciphering the crucial residues involved in heterodimerization of bak peptide and anti-apoptotic proteins for apoptosis [J]. *J Biomol Struct Dyn*, 2017, 2(5): 1-12.
- [18] ALSHATWI A A, SUBASHBABU P. Aloe-emodin protects RIN-5F (Pancreatic beta-cell) cell from glucotoxicity via regulation of pro-inflammatory cytokine and downregulation of bax and caspase 3 [J]. *Biomol Ther*, 2016, 24(1): 49-56.
- [19] RENAULT T T, TEIJIDO O, ANTONSSON B, et al. Regulation of Bax mitochondrial localization by Bcl-2 and Bcl-x(L): keep your friends close but your enemies closer [J]. *Int J Biochem Cell Biol*, 2013, 45(1): 64-67.
- [20] FUENTES M, ANDREWS M. Effects of high iron and glucose concentrations over the relative expression of Bcl2, Bax, and Mfn2 in MIN6 cells [J]. *Biol Trace Elem Resh*, 2013, 153(1): 390-395.
- [21] GABALLAH H H, ZAKARIA S S, MWAIFY S E, et al. Mechanistic insights into the effects of quercetin and/or GLP-1 analogue liraglutide on high-fat diet/streptozotocin-induced type 2 diabetes in rats [J]. *Biomed Pharmacother*, 2017(92): 331.
- [22] XIANG Z Y, LIN S M, REN S, et al. Progress on effects of endoplasmic reticulum stress and inflammation on apoptosis of beta cells in type 2 diabetes [J]. *Prog Veter Med(动物医学进展)*, 2016, 37(6): 91-94.
- [23] TEODORO T, ODISHO T, SIDOROVA E, et al. Pancreatic β -cells depend on basal expression of active ATF6 α -p50 for cell survival even under nonstress conditions [J]. *Am J Physiol Cell Physiol*, 2012, 302(7): C992-1003.
- [24] LI Y, GUO Y, TANG J, et al. New insights into the roles of CHOP-induced apoptosis in ER stress [J]. *Acta Biochim Biophys Sin*, 2015, 47(2): 629-640.
- [25] GUO G, MENG Y, TAN W, et al. Induction of apoptosis coupled to endoplasmic reticulum stress through regulation of CHOP and JNK in bone marrow mesenchymal stem cells from patients with systemic lupus erythematosus [J]. *J Immunol Res*, 2015(2015): 1837-1838.
- [26] NEMCOVA-FURSTOVA V, BALUSIKOVA K, SRAMEK J, et al. Caspase-2 and JNK activated by saturated fatty acids are not involved in apoptosis induction but modulate ER stress in human pancreatic β -cells [J]. *Cell Physiol Biochem*, 2013, 31(2/3): 277-289.
- [27] CUI W, MA J, WANG X, et al. Free fatty acid induces endoplasmic reticulum stress and apoptosis of β -cells by Ca²⁺/calpain-2 pathways [J]. *Plos One*, 2013, 8(3): e59921.
- [28] BROZZI F, NARDELLI T R, LOPES M, et al. Cytokines induce endoplasmic reticulum stress in human, rat and mouse beta cells via different mechanisms [J]. *Diabetologia*, 2015, 58(10): 2307-2316.
- [29] BROZZI F, GERLO S, GRIECO F A, et al. Ubiquitin D regulates IRE1/JNK-dependent apoptosis in pancreatic beta cells [J]. *J Biol Chem*, 2016, 4(9): 1-35.
- [30] WANG L J, TIAN K C, WU W W, et al. Recent advances on the signal transduction pathways of apoptosis [J]. *China Anim Husbandry Veter Med(中国畜牧兽医)*, 2011, 38(10): 132-135.
- [31] WANG Q, ZHANG H, ZHAO B, et al. IL-1 β caused pancreatic beta-cells apoptosis is mediated in part by endoplasmic reticulum stress via the induction of endoplasmic reticulum Ca²⁺ release through the c-Jun N-terminal kinase pathway [J]. *Mol Cell Biochem*, 2009, 324(1/2): 183-190.
- [32] 李娟, 陈庄. Caspase 家族与 2 型糖尿病胰岛 β 细胞凋亡的关系[J]. *中外医学研究*, 2016, 14(4): 154-155.
- [33] ZHANG W G, HAN G, WANG B, et al. Effect of curcumin solid dispersion on oxidative stress in diabetic rats [J]. *Chin J Mod Appl Pharm(中国现代应用药理学)*, 2010, 27(1): 13-15.
- [34] PRAUSE M C, BERCHTOLD L A, URIZAR A I, et al. TRAF2 mediates JNK and STAT3 activation in response to IL-1 β and IFN γ and facilitates apoptotic death of insulin-producing β -cells [J]. *Mol Cell Endocrinol*, 2015, 420: 24-36.
- [35] OMINAGA R, YAMAGUCHI S, SATAKE C, et al. The JNK pathway modulates expression and phosphorylation of 4E-BP1 in MIN6 pancreatic beta-cells under oxidative stress conditions [J]. *Cell Biochem Func*, 2010, 28(5): 387-393.
- [36] SHEN X, YANG L, YAN S, et al. Fetuin A promotes lipotoxicity in β -cells through the TLR4 signaling pathway and the role of pioglitazone in anti-lipotoxicity [J]. *Mol Cell Endocrinol*, 2015(412): 1-11.

收稿日期: 2017-07-15
 (本文责编: 曹粤锋)