LC-MS 快速测定面膜中的地塞米松

王新财¹, 胡磊^{2*} (1.湖州市食品药品检验研究院, 浙江 湖州 313000; 2.浙江省食品药品检验研究院, 杭州 310052)

摘要: 目的 建立一种快速测定面膜中地塞米松含量的 LC-MS 法。方法 面膜样品加泼尼松为内标后, 用饱和氯化钠和乙腈提取, 用 C₁₈ 粉末净化后直接上机分析。测定采用 SB-C₁₈(50 mm×2.1 mm, 1.8 μm) 为分离色谱柱, 以甲醇-0.1% 甲酸(90:10) 为流动相, 柱温 35 °C, 流速 0.2 mL·min⁻¹, 扫描方式是多反应监测模式。结果 地塞米松在 0.2~10 μg·mL⁻¹ 内线性良好($r=0.9998$), 高中低水平的回收率分别为 104.4%, 95.8% 和 93.3%, 相应 RSD 分别为 1.0%, 0.3% 和 1.1%。检测 40 批实际样品, 检出 1 批地塞米松含量为 3.51 mg·kg⁻¹。结论 本方法可以快速准确地测定面膜中的地塞米松。

关键词: 地塞米松; 内标; 面膜; 糖皮质激素; 液质联用

中图分类号: R917.101 文献标志码: B 文章编号: 1007-7693(2018)06-0836-04

DOI: 10.13748/j.cnki.issn1007-7693.2018.06.011

引用本文: 王新财, 胡磊. LC-MS 快速测定面膜中的地塞米松[J]. 中国现代应用药学, 2018, 35(6): 836-839.

Fast Determination of Dexamethasone in Facial Mask by LC-MS

WANG Xincal¹, HU Lei^{2*} (1. Huzhou Institute for Food and Drug Control, Huzhou 313000, China; 2. Zhejiang Institute for Food and Drug Control, Hangzhou 310052, China)

ABSTRACT: OBJECTIVE To establish a fast liquid chromatography-mass spectrometry method for determination of dexamethasone in facial mask. **METHODS** The facial mask samples were added prednisone as internal standard, then extracted by saturated sodium chloride and acetonitrile, injected and analyzed after purified by C₁₈ powder. An SB-C₁₈ column(50 mm×2.1 mm, 1.8 μm) was used as stationary phase and methanol-0.1% formic acid(90:10) was used as the mobile phase. The flow rate was 0.2 mL·min⁻¹ and the column temperature was 35 °C. The scan mode was multi reaction monitoring. **RESULTS** The linear of dexamethasone acted well in range of 0.2–10 μg·mL⁻¹($r=0.9998$). The recoveries of high, middle and low concentration were 104.4%, 95.8% and 93.3%, the RSDs were 1.0%, 0.3% and 1.1% respectively. There was one sample detected for 3.51 mg·kg⁻¹ dexamethasone in 40 actual samples. **CONCLUSION** This method has been validated for determination of dexamethasone in facial mask accurately and rapidly.

KEY WORDS: dexamethasone; internal standard; mask; glucocorticoids; LC-MS

地塞米松为常见的糖皮质激素, 这种激素对轻度面部皮炎等病症会产生明显的效果, 使用后皮肤很快变得光滑。但长期使用会产生激素依赖, 引起全身的不良反^[1], 我国和欧盟早就将其列为禁用物质^[2-3]。2015 年 8 月 22 日国家食品药品监督管理总局关于 11 批次面膜类化妆品不合格的通告(2015 年第 56 号)中, 通报 11 批次面膜类产品存在非法添加糖皮质激素^[4]。由于微商等网络渠道化妆品的兴起与发展, 化妆品市场的安全性无法有效保障。经临床和市场抽样发现, 化妆品中激素的添加成为一个日趋严重的问题, 地塞米松就是常见的添加物质之一。检测糖皮质激素一般用 GB/T24800.2-2009 所载方法^[5], 但是需要 2 次提取以及过柱净化, 前处理过程繁琐, 非常不适合大批量处理, 对操作要求也高, 难以得到准确的结

果。目前的相关文献中, 部分涉及液质条件的优化^[6], 不能解决主要矛盾; 部分提出了一些用于检测的新仪器和新方法^[7-8], 普遍有通用性不强和方法不够稳定的缺点。实际检测需要更实用、高效、快速、稳定、简便的方法。

本实验通过查阅文献和反复试验, 使用内标追踪和 C₁₈ 净化的办法, 建立了一套便捷、高效、准确地测定化妆品中地塞米松的方法, 并检测了大量实际样品, 验证了方法的可靠性。

1 材料与方法

1.1 仪器与试剂

Agilent 6490-G1290QQQ 型液质联用仪(美国 Agilent); 涡旋振荡仪(广州依科 MS3); MULTIFUGE X1 热电高速离心机(美国热电); 57044 型固相萃取仪(美国 Supelco); Genpure

作者简介: 王新财, 男, 硕士, 副主任药师 Tel: (0572)2750808
药师 Tel: (0571)87180330 E-mail: hl3632086@163.com

E-mail: 357283692@qq.com *通信作者: 胡磊, 男, 硕士, 主管

UV/UF 型热电纯水仪(美国热电); MV5 型自动浓缩仪(北京莱伯泰科仪器股份有限公司)。

地塞米松对照品(批号: 100129-201105, 含量: 99.7%)和泼尼松对照品(批号: 100199-201503, 含量: 99.6%)均购自中国食品药品检定研究院; 乙腈、甲醇(色谱纯, 默克公司); 乙酸锌、氯化钠、亚铁氰化钾(分析纯, 国药集团); Oasis HLB 固相萃取小柱(3 mL/60 mg, Waters 公司); 面膜来源: 市场购买。

1.2 方法

1.2.1 对照品溶液的配制 精密称取地塞米松和泼尼松对照品约 10 mg, 分别用甲醇稀释至 10.0 mL, 分别作为对照品和内标储备液。

1.2.2 标准曲线 取地塞米松和泼尼松储备液各适量, 用 40%乙腈稀释, 使地塞米松浓度为 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.0 $\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$, 其中内标的浓度恒定为 0.5 $\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$, 对照品与供试品进样量均为 1 μL 。

1.2.3 样品前处理 方法一: 称取上述供试品(初筛为阳性的面膜)约 0.2 g, 分别加入内标适量(保证内标终浓度为 0.5 $\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$), 于 10 mL 具塞离心管中, 加入 3 mL 饱和氯化钠, 涡旋混匀, 加入 2 mL 乙腈, 混匀, 涡旋提取 2 min, 5 000 $\text{r}\cdot\text{min}^{-1}$ 离心 10 min, 取上层清液加 C_{18} 粉末 100 mg 振荡 1 min, 5 000 $\text{r}\cdot\text{min}^{-1}$ 离心 5 min, 取上清进样分析。

方法二: 按 GB/T 24800.2-2009, 称取供试品(与方法一中样品相同)约 0.2 g 于 10 mL 具塞离心管中, 加入 3 mL 饱和氯化钠溶液, 涡旋混匀, 加入 2 mL 乙腈, 混匀, 涡旋提取 2 min, 5 000 $\text{r}\cdot\text{min}^{-1}$ 离心 10 min。吸取上清于另一 50 mL 具塞离心管中, 下层溶液用 2 mL 乙腈重复提取一次, 合并 2 次乙腈提取液, 准确加入 40 mL 水, 混匀, 加入 10%亚铁氰化钾溶液 0.2 mL, 混匀, 加入 20%乙酸锌溶液 0.2 mL, 混匀, 5 000 $\text{r}\cdot\text{min}^{-1}$ 离心 10 min, 取上清液进行固相萃取。

Waters Oasis HLB 固相萃取小柱预先依次用甲醇 5 mL, 水 10 mL 活化后, 将提取液样品用滤纸过滤后流经小柱, 待样品溶液流尽后, 使用 10%乙腈水溶液 10 mL 清洗。待清洗液流尽后, 准确吸取甲醇 4 mL 淋洗小柱, 收集洗脱液, 收集完成后氮气吹干, 准确加入 5 mL 50%甲醇溶解, 得供试品溶液。

1.2.4 液质条件 色谱条件: 色谱柱 SB-C₁₈ (100 mm×2.1 mm, 1.8 μm), 柱温 35 $^{\circ}\text{C}$, 流动相为甲醇-0.1%甲酸(90:10), 流速: 0.2 $\text{mL}\cdot\text{min}^{-1}$ 。

质谱条件: 电离源 ESI, 毛细管温度为 300 $^{\circ}\text{C}$, 鞘气流速为 7 $\text{L}\cdot\text{min}^{-1}$, 源压力 3.5 kV, 正离子模式, 扫描方式为多反应监测模式; 母离子为 359(泼尼松)和 393(地塞米松), 子离子为 147(359)、341(359)、355(393)和 147(393), 其中 359>341 和 393>355 分别为泼尼松和地塞米松的定量离子对。

2 结果

2.1 2 种方法结果的比较

方法一供试品的平均检测结果为 20.15 $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$, 方法二供试品的平均检测结果为 19.75 $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$, 结果偏差为 1.7%, 表明用方法一后也能得到准确结果。方法二步骤非常繁琐, 耗材较贵, 不适合大规模的样品处理, 选择优化方法一的方法。

2.2 线性关系

以相对峰面积(y)对相对浓度(x, $\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$)绘制内标标准曲线, 方程 $y=0.4047x+0.0046$, 线性范围为 0.2~10 $\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$, 相关系数为 0.9998, 线性关系良好。

2.3 精密度试验

以浓度为 0.5 $\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的对照品(加入内标使浓度为 0.5 $\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$)平行进样 6 次, 测定比值(对照品峰面积/内标峰面积), 计算 RSD 为 0.5%。

2.4 稳定性试验

取中水平加标样品分别于 0, 2, 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48 h 测定其比值(对照品峰面积/内标峰面积), RSD 为 2.7%, 稳定性良好。

2.5 重复性试验

平行制备 6 份同水平加标样品(加标水平为 1 $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$)进行测定, 结果分别为 1.06, 1.08, 1.06, 1.05, 1.03, 1.09 $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$, RSD 为 2.0%, 重复性良好。

2.6 空白试验

选空白样品按方法一处理, 上机分析, 目标物出峰处无干扰, 空白专属性良好, 见图 1。

2.7 回收率试验

称样品 9 份, 做高中低 3 水平加标试验, 每个水平平行 3 份, 加标水平分别为 0.2, 0.5, 1.0 $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$, 按方法一处理得结果, 回收率为 90%~110%, RSD<1.5%, 结果见表 1。加标回收率典型图谱见图 2。

图1 空白样品典型图谱(总离子流图和提取离子流图)

Fig. 1 The typical chromatograms of blank sample (TIC and EIC)

图2 加标样品典型图谱(总离子流图和提取离子流图)

Fig. 2 The typical chromatograms of spiked sample (TIC and EIC)

表1 回收率测定结果

Tab. 1 The results of recovery test

回收率	平行 1/%	平行 2/%	平行 3/%	平均值/%	RSD/%
低水平	92.1	93.5	94.2	93.3	1.1
中水平	95.5	95.7	96.1	95.8	0.3
高水平	105.6	103.8	103.9	104.4	1.0

2.8 检出限与定量限

称 0.2 g 空白样品, 加入适当对照品, 进行检出限和定量限试验, 按照 $S/N=3$ 和 $S/N=10$ 分别计算得到检出限为 $0.005 \text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ ($S/N=3$), 定量限为 $0.2 \text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ ($S/N=10$)。

2.9 实际样品检测

从市场上买来 40 批面膜样品, 使用本方法检测, 其中有 1 批检出地塞米松, 检出量为 $3.51 \text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}$, 国标 GB/T 24800.2-2009 测试结果为 $3.48 \text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}$, 偏差为 0.4%, 其余未检出结果一致。

3 总结与讨论

3.1 提取溶剂的选择

在提取试验阶段, 采用甲醇、水、60%乙腈、40%乙腈、乙酸乙酯分别提取, 发现甲醇、乙腈和乙酸乙酯提取效率不足 50%, 60%和 40%乙腈水

溶液乳化严重, 离心和过滤都难以澄清, 水提取发现杂质太多, 难以净化, 故仍然选择饱和氯化钠提取结合乙腈再次萃取的方式(饱和氯化钠可以和乙腈充分分层), 效果良好。

3.2 净化条件的优化

采用 C_{18} 、弗罗里硅土、PSA, 各加入 100 mg, 其他实验过程相同, 考察净化结果并比较, 其中 C_{18} 处理的回收率结果更接近 100%, 弗罗里硅土和 PSA 的回收率结果在 130%~140%之间, 明显净化效果不好, 故选择 C_{18} 颗粒作为净化剂。

3.3 内标的选择

内标要选择一种结构类似、性质接近的物质, 优化实验中曾经选取过倍他米松、氟米松、泼尼松、甲基泼尼松龙等糖皮质激素为内标, 倍他米松离子对与地塞米松相同, 不能区分, 氟米松和甲基泼尼松龙作为内标, 回收率<80%, 综合考虑, 选择泼尼松, 与地塞米松结构类似, 分子量接近且有区别, 色谱行为类似, 能明显地降低基质效应, 且性质稳定, 容易获得, 实际试验效果良好。

3.4 LC-MS 条件的选择

通过比较甲醇-甲酸, 甲醇-甲酸铵, 乙腈-甲

酸, 乙腈-甲酸铵体系, 发现在甲醇-甲酸体系下这 2 种激素相应最佳, 在 90% 的有机相条件下洗脱可大大缩短分析时间(2 min 内出峰完成), 提高效率且不影响结果的准确性, 并通过 Agilent Masshunter Optimizer 软件自动筛选定量及定性离子对, 并对碰撞能量进行优化, 得到多反应监测模式的实验条件, 通过上述一系列的条件优化, 实现快速准确地完成分析的目标。

泼尼松作为另一种糖皮质激素, 与地塞米松结构类似, 能够用泼尼松做内标, 可以追踪实验全流程, 简化提取净化过程, 很好地规避提取过程的基质效应和损失, 不需过柱和复溶, 使过程大大简化, 且不使用固相萃取柱和相关试剂, 明显降低成本, 实现对整体实验过程的全面优化, 从而达到方便高效准确地分析面膜中地塞米松的目的。目前仅限于面膜基质, 其他基质需要进一步优化和试验, 但本研究为糖皮质激素的测定提供了一种新的思路, 并为监管提高效率提供支持, 前景广阔。

REFERENCES

- [1] LU H G. Facial corticosteroid addictive dermatitis [J]. *J Clin Dermatol*, 2006, 35(10): 682-684.
- [2] 化妆品安全技术规范[S]. 2015: 57.
- [3] The Cosmetics Directive of the Council European Communities. 76/768/EEC [S]. 2008: 81.
- [4] 国家食品药品监督管理总局. 国家食品药品监督管理总局关于 11 批次面膜类化妆品不合格的通告(2015 年第 56 号) [EB/OL][2015-08-22]. <http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0087/127700.html>.
- [5] GB/T 24800. 2-2009. Determination of 41 glucocorticoids in cosmetics by LC-MS-MS and TLC method [S]. 2009: 1-19.
- [6] ZHAO X Y, LIN Y F, HU X Z et al. Determination of 9 glucocorticoids in cosmetics by reversed-phase high performance liquid chromatography [J]. *Chin J Anal Lab(分析试验室)*, 2009, 28(2): 111-115.
- [7] OU B L, ZHAO J L, ZOU Y, et al. Simultaneous determination of 16 glucocorticoids added in Chinese patent medicine and health products by HPLC [J]. *Chin J Mod Appl Pharm(中国现代应用药学)*, 2016, 33(9): 1178-1182.
- [8] LIU F K, CHANG Y C. Using thiol-capped gold nanoparticles in the background solution of MEKC to concentrate and separate neutral steroids [J]. *Chromatographia*, 2010, 72(11/12): 1129-1135.

收稿日期: 2017-09-07

(本文责编: 曹粤锋)