益气活血通络法对 COPD 大鼠肺血管重构的影响

何飞¹, 汝触会¹, 徐俭朴^{1*}, 王辉², 蔡宛如³(1.浙江省中西医结合医院, 杭州 310003; 2.浙江中医药大学, 杭州 310053; 3.浙江中医药大学附属第二医院, 杭州 310005)

摘要: 目的 观察益气活血通络法对慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary diseases, COPD)大鼠肺血管重构 IL-6/JAK/STAT 信号转导通路的影响。方法 SD 大鼠 50 只, 随机均分为正常对照组、模型组、中药组、西药组和中西医结合组。采用气道滴注脂多糖联合香烟烟雾暴露的方法制备大鼠 COPD 肺血管重构模型。药物干预后各组大鼠右下肺叶行 HE 染色观察肺血管病理形态学变化, 并采用 ELISA 法检测血清 IL-6 含量变化; Western blot 测定肺组织 p-JAK2 和 p-STAT3 蛋白表达水平; 免疫组化技术检测肺动脉增殖细胞核抗原(proliferating cell nuclear antigen, PCNA)蛋白表达。结果 与模型组比较, 各药物组大鼠血清 IL-6 含量及肺动脉 PCNA 表达显著减少($P<0.05$ 或 <0.01), p-JAK2 和 p-STAT3 表达显著降低(P 均 <0.01); 中西医结合组较中药组及西药组 p-JAK2 表达均显著下降(P 均 <0.01)。结论 中医益气活血通络法能有效减轻 COPD 大鼠肺血管重构, 其机制可能与抑制 IL-6/JAK/STAT 信号转导通路进而调节肺小动脉 PCNA 表达有关。

关键词: 益气活血通法; 肺血管重构; IL-6/JAK/STAT 信号转导通路; 增殖细胞核抗原; 慢性阻塞性肺疾病

中图分类号: R285.5 文献标志码: A 文章编号: 1007-7693(2018)10-1439-04

DOI: 10.13748/j.cnki.issn1007-7693.2018.10.001

引用本文: 何飞, 汝触会, 徐俭朴, 等. 益气活血通络法对 COPD 大鼠肺血管重构的影响[J]. 中国现代应用药学, 2018, 35(10): 1439-1442.

Effect of Tonifying Qi, Promoting Blood Flow and Dredging Collaterals Treatment on Pulmonary Vascular Remodeling of COPD Rats

HE Fei¹, RU Chuhui¹, XU Jianpu^{1*}, WANG Hui², CAI Wanru³(1.Zhejiang Chinese and Western Medicine Integrated Hospital, Hangzhou 310003, China; 2.Zhejiang Chinese Medical University, Hangzhou 310053, China; 3.The Second Affiliated Hospital of Zhejiang Chinese Medical University, Hangzhou 310005, China)

ABSTRACT: OBJECTIVE To observe the effects of tonifying Qi, promoting blood flow and dredging collaterals treatment on IL-6/JAK/STAT signaling pathway of pulmonary vascular remodeling of COPD rats. **METHODS** Fifty SD rats were randomly divided into normal control group, model group, Chinese medicine group, western medicine group, and integrated Chinese and western medicine group. The rat model of COPD was established by intratracheal instillation of LPS and daily exposure to cigarette-smoking. The pathological features of pulmonary arteries were observed by microscope after intervention of drugs. The serum contents of IL-6 was detected by ELISA. The expressions of p-JAK2 and p-STAT3 were detected by Western blot. The content of the protein expression levels of PCNA in pulmonary artery were detected by immunohistochemistry. **RESULTS** The serum content of IL-6 and protein expression levels of PCNA in each drug group was significantly lower than in model group($P<0.05$ or <0.01). P-JAK2 and p-STAT3 expression level in each drug group was significantly lower than in model group($P<0.01$). P-JAK2 expression level in integrated Chinese and western medicine group was lower than in Chinese medicine group and western medicine group significantly($P<0.01$). **CONCLUSION** Tonifying Qi, promoting blood flow and dredging collaterals treatment may reduce the remodeling of pulmonary vascular by the way of inhibiting the activation of IL-6/JAK/STAT signal pathway, which can lead to regulate the protein expression levels of PCNA.

KEY WORDS: tonifying Qi, promoting blood flow and dredging collaterals treatment; pulmonary vascular remodeling; IL-6/JAK/STAT signaling pathway; PCNA; COPD

基金项目: 国家自然科学基金项目(81403336)

作者简介: 何飞, 男, 副主任医师 Tel: (0571)56109765 E-mail: lung1024@163.com *通信作者: 徐俭朴, 女, 主任医师 Tel: (0571)56109765 E-mail: xujianpu1@163.com

慢性阻塞性肺疾病 (chronic obstructive pulmonary diseases, COPD) 主要的病理改变包括气道重塑和肺动脉血管重构。气道重塑是 COPD 患者肺功能持续气流受限的重要病理基础, 而肺血管重构是 COPD 产生肺动脉高压、肺心病并持续进展的重要原因^[1]。多种细胞因子引起肺血管细胞内信号转导通路发生变化是诱导肺血管重构的重要分子机制, IL-6/JAK/STAT 信号转导通路与血管细胞生长、增殖和分化间的关系十分密切, 并在血管平滑肌细胞增殖和迁移中发挥着重要作用^[2], 可能是参与肺血管重构的分子机制之一。现代西医治疗 COPD 肺血管重构的药物较少、价格昂贵, 同时疗效不理想, 中医药在治疗 COPD 肺血管重构方面具有一定优势^[3]。本研究通过建立 COPD 大鼠模型, 基于 IL-6/JAK/STAT 信号转导通路探讨益气活血通络法(采用国家级名老中医王会仍经验方保肺定喘汤)对 COPD 大鼠肺血管重构的干预机制, 为治疗 COPD 及其并发症提供参考。

1 材料与方法

1.1 动物

清洁级健康 SD 大鼠 50 只, ♂, 5 周龄, 体重(150±20)g, 由浙江中医药大学动物实验中心提供, 动物许可证号: SYXK(浙)2013-0184, 所有动物均饲养于清洁级动物房。

1.2 药物

保肺定喘汤, 组成: 党参 15 g、黄芪 15 g、丹参 15 g、当归 10 g、熟地 15 g、麦冬 9 g、广地龙 15 g、仙灵脾 10 g、桔梗 9 g、甘草 6 g, 上述药物由浙江中医药大学附属中西医结合医院中药制剂室制成流浸膏, 生药含量 3.1 g·mL⁻¹, 4℃ 储备; 布地奈德混悬液(阿斯利康制药有限公司, 批号: 317538; 规格: 每支 1 mg)。

1.3 试剂和仪器

脂多糖(lipopolysaccharides, LPS)试剂盒(美国 Sigma 公司, 货号: L2630); 香烟(大前门牌, 上海卷烟厂, 每支含烟碱量为 13 mg, 尼古丁为 1.0 mg); 大鼠 IL-6 ELISA 检测试剂盒(杭州联科生物有限公司, 货号: 70-EK3062/2; 规格 96T); phospho-JAK2(phospho Y1007+Y1008)抗体(货号: ab32101)、Anti-JAK2 抗体(货号: ab39636)均购自美国 Abcam 公司; Phospho-Stat3(Tyr705)抗体(美国 Cell Signaling Technology 公司, 货号: 9145S); Stat3 (D3Z2G) Rabbit mAb(货号: 12640)、PCNA

抗体(货号: 13110S)均购自美国 Cell Signaling Technology 公司。

酶标仪(美国伯腾仪器有限公司); 低温高速离心机(德国 Eppendorf 公司); BX43 型光学显微镜(OLYMPUS 公司); Prisma 型全自动生物组织染色机(Tissue-Tek 公司)。

1.4 动物分组、造模及给药

SD 大鼠 50 只, ♂, 按随机数字表法随机分成 5 组: 正常对照组、模型组、中药组、西药组及中西医结合组, 每组 10 只。采用气道滴注 LPS 联合烟熏方法建立 COPD 模型, 参照相关文献^[4], 大鼠在自制吸烟染毒箱内被动吸烟 20 支, 每天 2 次, 每次 30 min, 间隔 8 h, 共 70 d; 造模第 1, 28 天, 每只大鼠气道内滴入 LPS 0.2 mL(200 μg), 该日内不给予吸烟。正常对照组大鼠每天在自制吸烟染毒箱内以相同时间呼吸正常空气并于造模第 1, 28 天气道内滴入 0.2 mL 生理盐水。造模后第 29~70 天给药, 用药量按照体质量 60 kg 的成年人每日常规服用药量换算, 通用公式: (动物体质量/人的体质量)×人用药量×6.25^[5]。正常对照组、模型组生理盐水灌胃, 西药组雾化吸入布地奈德混悬液(50 μg·kg⁻¹), 中药组给予保肺定喘汤灌胃(12.4 g·kg⁻¹·d⁻¹), 中西医结合组同时予保肺定喘汤灌胃及雾化吸入布地奈德。

1.5 观察指标及检测方法

1.5.1 各组大鼠肺小动脉病理形态学改变 取右下叶肺组织, 右肺门横断取材, 常规石蜡制片, HE 染色, 光学显微镜下观察肺小动脉形态学改变。

1.5.2 各组大鼠血清白细胞介素-6(IL-6)测定 采用 ELISA 法检测血清 IL-6, 操作方法严格按照试剂盒说明书进行。

1.5.3 肺小动脉 PCNA 测定 使用免疫组化染色法检测大鼠肺小动脉 PCNA 含量。采用 Image-pro plus 6.0 软件进行图像分析, 在 200 倍光镜下观察 PCNA 免疫组化染色切片, 以固定颜色模式界定色调、饱和度、颜色强度等条件下测得的大鼠肺小动脉壁内 PCNA 平均吸光度值作为其相对含量, 每张切片均选取 3~5 个小动脉进行测量, 并取其平均值进行统计学分析。

1.5.4 各组大鼠肺组织中磷酸化 JAK2(p-JAK2)和 STAT3 蛋白表达的测定 采用 Western blot 法分析大鼠肺组织中 p-JAK2 及 p-STAT3 蛋白表达。取 1 mm³ 肺组织, 液氮研磨制作肺组织匀浆, 每个标

本中加入裂解液混合物(含增强型 RIPA、蛋白酶抑制剂 PMSF)100 μL , 冰上裂解 30 min, 每 10 min 振荡器上振荡 1 次, 共 3 次。离心机预冷 4 $^{\circ}\text{C}$, 13 000 $\text{r}\cdot\text{min}^{-1}$ 离心 12 min, 取上清 150 μL , 加入新的已预冷 EP 管。采用 BCA 法进行蛋白定量。总蛋白经 SDS-PAGE 分离后, 转移到 PVDF 膜上, 室温下用 5%脱脂奶粉封闭 2 h, TBST 洗一遍, 孵相应 I 抗过夜, 然后用 TBST 洗 10 min 3 次, 室温孵相应 II 抗 2 h, 再用 TBST 洗 10 min 3 次。ECL 发光液将 PVDF 膜显色, 凝胶成像系统扫描分析结果。

1.6 统计学方法

采用 SPSS 22.0 统计软件包进行处理。所得数据以 $\bar{x} \pm s$ 表示, 满足正态性且方差齐时采用单因素方差分析, 两两比较采用 SNK 法检验, 方差不齐性则采用 Tamhane's T_2 法进行方差检验, 若不足正态时采用秩和检验。以 $P < 0.05$ 作为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 各组大鼠肺小动脉病理形态学变化

HE 染色可见正常对照组大鼠肺小动脉内皮细胞扁平连续, 管壁薄; 模型组肺小动脉内皮细胞变性肿胀, 平滑肌细胞增生肥厚明显, 厚薄不一致, 管腔变小、不规则; 各药物组大鼠肺小动脉血管壁不同程度增厚、管腔略有变窄, 较模型组均有不同程度减轻。见图 1。

图 1 大鼠小肺动脉病理形态(HE 染色, $\times 200$)

A-正常对照组; B-模型组; C-中药组; D-西药组; E-中西医结合组。

Fig. 1 The pathological features of pulmonary arteries in rats(HE staining, $\times 200$)

A-normal control group; B-model group; C-Chinese medicine group; D-western medicine group; E-integrated Chinese and western medicine group.

2.2 各组大鼠血清 IL-6 比较

与正常对照组比较, 模型组与各药物组大鼠血清 IL-6 含量均显著升高, 差异具有统计学意义 ($P < 0.01$)。与模型组比较, 各药物治疗组血清 IL-6 均有不同程度显著降低 (P 均 < 0.01), 各药物治疗组之间比较差异无统计学意义。结果见图 2。

图 2 各组大鼠血清 IL-6 含量比较($n=10$)

与正常对照组比较, $^1P < 0.01$; 与模型组比较, $^2P < 0.01$ 。

Fig. 2 Comparison of IL-6 in the blood serum among different groups of rats($n=10$)

Note: Compared with the normal control group, $^1P < 0.01$; compared with the model group, $^2P < 0.01$.

2.3 各组大鼠肺小动脉 PCNA 表达比较

与正常对照组 PCNA 表达(0.0025 ± 0.0008)比较, 模型组 PCNA 表达(0.0141 ± 0.0083)显著增加 ($P < 0.01$); 与模型组比较, 中药组(0.0097 ± 0.0024)、西药组(0.0085 ± 0.0027)与中西医结合组(0.0070 ± 0.0022)PCNA 表达显著降低 ($P < 0.05$ 或 $P < 0.01$); 各药物治疗组之间差异无统计学意义。

2.4 各组大鼠肺组织 p-JAK2 和 p-STAT3 蛋白表达变化

Western blot 检测结果显示, 与正常对照组比较, 模型组及各药物治疗组 p-JAK2 表达显著增加 (P 均 < 0.01); 与模型组比较, 各药物治疗组 p-JAK2 表达均显著降低 (P 均 < 0.01); 中西医结合组较中药组及西药组 p-JAK2 表达均显著下降 (P 均 < 0.01), 中药组和西药组比较无统计学差异。

与正常对照组比较, 模型组及各药物治疗组 p-STAT3 表达均显著增加 (P 均 < 0.01); 与模型组比较, 各药物治疗组 p-STAT3 表达均显著降低 (P 均 < 0.01)。各药物治疗组之间差异无统计学意义。见表 1, 图 3。

表 1 大鼠肺组织 p-JAK2 和 p-STAT3 蛋白表达($n=10, \bar{x} \pm s$)

Tab. 1 Comparison of the protein expression levels of p-JAK2 and p-STAT3 in lung tissue of rats($n=10, \bar{x} \pm s$)

组别	p-JAK2/ β -actin	p-STAT3/ β -actin
正常对照组	0.519 $\pm$ 0.088	0.199 $\pm$ 0.027
模型组	1.988 $\pm$ 0.184 ¹⁾	0.932 $\pm$ 0.099 ¹⁾
中药组	1.319 $\pm$ 0.147 ¹⁾²⁾³⁾	0.532 $\pm$ 0.080 ¹⁾²⁾
西药组	1.281 $\pm$ 0.156 ¹⁾²⁾³⁾	0.518 $\pm$ 0.061 ¹⁾²⁾
中西医结合组	0.943 $\pm$ 0.100 ¹⁾²⁾	0.481 $\pm$ 0.078 ¹⁾²⁾

注: 与正常对照组比较, $^1P < 0.01$; 与模型组比较, $^2P < 0.01$; 与中西医结合组比较, $^3P < 0.01$ 。

Note: Compared with normal control group, $^1P < 0.01$; compared with model group, $^2P < 0.01$; compared with integrated Chinese and western medicine group, $^3P < 0.01$.

图 3 各组大鼠肺组织 p-JAK2 和 p-STAT3 蛋白表达情况
A-正常对照组; B-模型组; C-中药组; D-西药组; E-中西医结合组。
Fig. 3 Comparison of the protein expression levels of p-JAK2 and p-STAT3 in lung tissue of rats

A-normal control group; B-model group; C-Chinese medicine group; D-western medicine group; E-integrated Chinese and western medicine group.

3 讨论

COPD 是一种持续气流受限疾病,在疾病早期即可发生肺血管重构^[6]。肺血管重构在 COPD 肺动脉高压、肺心病形成过程中具有关键作用,主要表现为内皮损伤、增殖,肺动脉平滑肌细胞增殖导致血管中层增厚,胶原蛋白过度沉积,小血管腔闭塞等。炎症在慢性阻塞性肺疾病肺血管重构过程中具有一定作用^[7],IL-6 作为急性炎症反应的诱导因子,与血管性疾病进展密切相关,其作用的重要机制是 IL-6 能促进血管平滑肌的增殖以及单核细胞趋化因子-1 的释放,有研究证明这种促进作用是通过 JAK/STAT 信号通路来实现的^[2],说明在血管性疾病平滑肌细胞增殖的病理过程中,IL-6/JAK/STAT 扮演着重要角色。而平滑肌细胞增殖在肺血管重构中起到重要作用,PCNA 是反映细胞增殖状态的良好指标^[8]。深入研究 COPD 肺血管重构的发病机制,并进一步阐明中医临床治法对 COPD 肺血管重构干预作用的相关作用机制,是防治 COPD 及其并发症的重点所在。

中医目前认为 COPD 肺血管重构属肺络病范畴^[9],两者在病因病机、病位、病程及转归方面具有一定相关性^[10],发病中心环节均具有“气虚”和“痰瘀”2 个病理因素,所以益气活血通络法在各分型治疗中,都应适当运用。国内临床研究发现采用中医益气活血通络理论指导治疗 COPD 取得了良好的临床效果^[11-12]。但这些研究均没有进一步深入研究益气活血通络法干预 COPD 肺血管重构的机制。

本研究结果显示,模型组大鼠血清 IL-6 含量

显著升高,同时肺组织 p-JAK2 和 p-STAT3 蛋白表达显著增加($P<0.01$)。采用中医益气活血通络法(保肺定喘汤)干预后大鼠肺动脉病理形态学有不同程度改善,血清 IL-6、肺小动脉 PCNA 表达、肺组织 p-JAK2 和 p-STAT3 蛋白表达均显著减少($P<0.01$),说明中医益气活血通络法可以显著减轻肺血管重构,其机制可能与抑制 IL-6/JAK/STAT 信号转导通路进而调节肺小动脉 PCNA 表达有关,在今后的研究中可进一步在分子细胞水平阐述该信号系统对肺动脉平滑肌细胞增殖的作用。另一方面,本研究发现中西医结合组 p-JAK2 蛋白表达较中药组及西药组均显著下降($P<0.01$),说明中西医结合组在防治肺血管重构方面较单一疗法更具优势。本研究中的其他指标在 3 个药物组之间比较均无显著差异,可能与实验纳入样本量不够有关。

REFERENCES

- [1] SAKAO S, VOELKEL N F, TATSUMI K. The vascular bed in COPD: pulmonary hypertension and pulmonary vascular alterations [J]. *Eur Respir Rev*, 2014, 23(133): 350-355.
- [2] WATANABE S, MU W, KAHN A, et al. Role of JAK/STAT pathway in IL-6-induced activation of vascular smooth muscle cells [J]. *Am J Nephrol*, 2004, 24(4): 387-392.
- [3] HE F, XU J P. Progress of traditional Chinese medicine preventing and treating pulmonary vascular remodeling of COPD [J]. *Chin Arch Tradit Chin Med*(中华中医药学刊), 2015, 33(4): 823-825.
- [4] 方苏榕, 谷伟, 谭焰, 等. 烟熏联合内毒素构建 COPD 大鼠模型[J]. *南京医科大学学报(自然科学版)*, 2013, 33(9): 1226-1230.
- [5] 章元沛. 药理实验方法学[M]. 第 2 版. 北京: 人民卫生出版社. 1996: 238.
- [6] DING Y. Clinical efficacy of simvastatin in treatment of COPD complicated with pulmonary hypertension [J]. *Pharm Today*(今日药学), 2016, 26(8): 606-608.
- [7] 赵霞, 杨朝, 葛利军. 炎症在慢性阻塞性肺疾病相关肺动脉高压发病机制中的作用的研究进展[J]. *国际呼吸杂志*, 2013, 33(3): 218-221.
- [8] LU Z, LI S, ZHAO S, FA X. Upregulated miR-17 regulates hypoxia-mediated human pulmonary artery smooth muscle cell proliferation and apoptosis by targeting mitofusin 2 [J]. *Med Sci Monit*, 2016, 22(9): 3301-3308.
- [9] 何飞. 运用肺络理论治疗肺系疾病刍议[J]. *浙江中医杂志*, 2011, 46(8): 549-550.
- [10] 郑莉莉, 王婕琼, 李泽庚. “肺络微型癥瘕”与慢性阻塞性肺疾病肺血管重构的相关性[J]. *长春中医药大学学报*, 2017, 33(1): 7-9.
- [11] 何飞, 汝触会, 陈爱凤, 等. 益气活血通络法治疗慢性阻塞性肺疾病 D 组稳定期的临床观察[J]. *中华中医药学刊*, 2017, 35(6): 1466-1468.
- [12] 王胜, 陈悦, 任薇, 等. 益气活血法对慢性阻塞性肺疾病急性加重患者血浆纤维蛋白原及 D-二聚体的影响[J]. *中国中西医结合杂志*, 2015, 35(5): 537-540.

收稿日期: 2017-11-24
(本文责编: 李艳芳)