

金莲清热泡腾片致幼儿中枢神经兴奋、失眠 1 例

吴涛, 王润芝(威海市妇幼保健院, 青岛大学附属威海市立第二医院, 山东 威海 264200)

关键词: 金莲清热泡腾片; 中枢神经; 兴奋; 失眠

中图分类号: R969.4

文献标志码: B

文章编号: 1007-7693(2019)14-1830-01

DOI: 10.13748/j.cnki.issn1007-7693.2019.14.020

引用本文: 吴涛, 王润芝. 金莲清热泡腾片致幼儿中枢神经兴奋、失眠 1 例[J]. 中国现代应用药学, 2019, 36(14): 1830.

1 病例资料

患儿, 男, 10 月龄, 因“发热 7 d, 皮肤红色丘疹 4 d, 水肿性红斑 2 d”于 2018 年 8 月 18 日收入威海市妇幼保健院。既往否认药物、食物过敏史。入院体检: 体温 36.5 °C, 脉搏 125 次/分, 呼吸 28 次/分。专科情况: 额面部散在粟粒大小肤色丘疹; 躯干、四肢可见大小不等的水肿型红斑、丘疹, 未见水疱、淤点。完善相关检查后, 诊断为“多形红斑, 幼儿急疹”。遵医嘱于 2018 年 8 月 18 日给予糠酸莫米松乳膏 2 mg, 氟芬那酸丁酯软膏 2 g, 莫匹罗星乳膏 2 g, 外用, 每日 1 次; 口服马来酸氯苯那敏片 1.3 mg, 每天 3 次, 抗过敏治疗。8 月 22 日患儿受凉后出现发热, 体温最高时 37.8 °C, 同时伴有打喷嚏、流清涕等症状, 查血常规: 白细胞计数 $4.68 \times 10^9 \cdot L^{-1}$, 中性粒细胞百分比 25.2%, 淋巴细胞比例 58.6%, 全血 C 反应蛋白 $12.5 \text{ mg} \cdot L^{-1}$, 考虑上呼吸道感染, 加用金莲清热泡腾片 4 g(天津中盛海天, 国药准字: Z20103076, 批准文号: 1711035), 每日 3 次(加热开水适量, 泡腾溶解后口服)。8 月 23 日, 患儿家属述患儿夜间兴奋, 难以入睡。8 月 25 日, 患儿体温正常, 未再发热, 感冒、流涕症状减轻, 原有粟粒大小肤色丘疹和红斑消退, 患儿家属仍述患儿夜间兴奋、哭闹, 难以入眠, 考虑患儿体温稳定, 上呼吸道感染明显好转, 停用金莲清热泡腾片, 嘱多饮水, 继续观察病情。8 月 26 日, 患儿家属述患儿睡眠良好, 随访 3 日, 未再出现兴奋、失眠症状。

2 讨论

金莲清热泡腾片为中成药制剂, 内含金莲花、大青叶、石膏、知母、地黄、玄参、炒苦杏仁, 具有清热解毒, 利咽生津, 止咳祛痰作用, 可用于流行性感、上呼吸道感染等症, 曾入选北京中医药管理局甲型 H1N1 型流感市民预防手册《中医药防治手足口病临床技术指南》(2009 年版)。因其采用现代中药剂型泡腾片, 具有使用方便、口感好, 患儿依从性较高的特点, 故临床应用较为广泛。

本例患儿因上呼吸道感染口服金莲清热泡腾片, 于用药后当夜出现中枢性兴奋、失眠, 停药当日不良反应明显缓解, 继续使用其他药物, 且其他药物入院前一直使用, 可排除其他药物致敏的可能性。从临床表现来看, 使用金莲清热泡腾片与不良反应的发生有合理的时间关系, 故考虑该例患者的不良反应是由金莲清热泡腾片所致。

金莲清热泡腾片的药品说明书中记载的不良反应为尚不明确。查阅相关文献, 目前尚无该药引起不良反应的相关报道。

此次案例提示临床医师, 金莲清热泡腾片疗效肯定, 在临床使用较多, 随着该药的广泛应用, 不良反应亦有增加, 应引起医务人员的重视。本例患者为婴幼儿, 免疫力相对低下, 发生不良反应的风险较高, 临床应用时应多注意观察。

收稿日期: 2019-02-02

(本文责编: 曹粤锋)