HPLC 同时测定盐酸萘甲唑啉滴鼻液中 9 种抑菌剂

杨园¹, 谷亦平¹, 李苗¹, 陈闪闪², 童颖^{1*} (1. 武汉药品医疗器械检验所, 武汉 430075; 2. 湖北科技学院药学院, 湖北 咸宁 437100)

摘要: 目的 建立 HPLC 同时测定盐酸萘甲唑啉滴鼻液中 4 类 9 种常见抑菌剂硫柳汞、羟苯乙酯、苯甲酸钠、羟苯甲酯、羟苯丙酯、羟苯丁酯、山梨酸钾、苯扎氯铵和苯扎溴铵的含量。方法 采用 Ultimate XB-C₁₈(4.6 nm×250 nm, 5 μm) 色谱柱; 以乙腈(A)-0.1 mol·L⁻¹ 磷酸二氢钠(磷酸调 pH 3.7) 为流动相, 梯度洗脱, 流速 1.0 mL·min⁻¹, 柱温 35 °C, 检测波长 222 nm, 样品温度 5 °C。结果 9 种抑菌剂可完全分离, 平均回收率为 98.2%~100.6%, RSD 为 0.5%~1.5%。30 批样品中检出硫柳汞、羟苯乙酯、苯扎溴铵和苯甲酸钠 4 种抑菌剂。结论 该法可用于盐酸萘甲唑啉滴鼻液中抑菌剂的质量控制。

关键词: 抑菌剂; 硫柳汞; 苯扎溴铵; 羟苯乙酯; 苯甲酸钠; 盐酸萘甲唑啉滴鼻液; 鼻用制剂; 高效液相色谱法

中图分类号: R927.11 文献标志码: B 文章编号: 1007-7693(2019)20-2552-05

DOI: 10.13748/j.cnki.issn1007-7693.2019.20.013

引用本文: 杨园, 谷亦平, 李苗, 等. HPLC 同时测定盐酸萘甲唑啉滴鼻液中 9 种抑菌剂[J]. 中国现代应用药学, 2019, 36(20): 2552-2556.

Simultaneous Determination of 9 Bacteriostats in Naphazoline Hydrochloride Nasal Drops by HPLC

YANG Yan¹, GU Yiping¹, LI Miao¹, CHEN Shanshan², TONG Ying^{1*} (1. Wuhan Institute For Drug and Medical Device Control, Wuhan 430075, China; 2. School of Pharmacy, Hubei University of Science and Technology, Xianning 437100, China)

ABSTRACT: OBJECTIVE To establish an HPLC method for simultaneous determination of 4 categories and 9 species common bacteriostats which might be added into naphazoline hydrochloride nasal drops, including thimerosal, ethylparaben, sodium benzoate, methylparaben, propylparaben, butylparaben, sorbic acid, benzalkonium chloride, benzalkonium bromide. **METHODS** The analysis was performed on Ultimate XB-C₁₈ column(4.6 mm×250 mm, 5 μm) at 35 °C, eluted with a gradient program using acetonitrile(A)-0.1 mol·L⁻¹ sodium phosphate monobasic(pH was adjusted to 3.7 with phosphoric acid) as the mobile phase. The flow rate was 1.0 mL·min⁻¹, the detection wavelength was 222 nm, and sample was stored at 5 °C. **RESULTS** Under the above conditions, 9 bacteriostats were separated completely. The average recoveries of the 9 components were between 98.2%–100.6%, with RSDs of 0.5%–1.5%. The contents of thimerosal, benzalkonium bromide, ethylparaben and sodium benzoate were detected in 30 batches of naphazoline hydrochloride nasal drops. **CONCLUSION** The method is suitable to evaluate the quality of bacteriostats in naphazoline hydrochloride nasal drops.

KEYWORDS: bacteriostat; thimerosal; benzalkonium bromide; ethyl hydroxybenzoate; sodium benzoate; naphazoline hydrochloride nasal drops; nasal preparation; HPLC

鼻用制剂属于临床局部外用剂型, 根据给药频次, 可将其分为单剂量制剂和多剂量制剂。中国药典 2015 年版规定多剂量水性介质鼻用制剂应当添加适宜浓度的抑菌剂, 以防止鼻用制剂在正常贮藏和使用过程中, 由于微生物污染和繁殖, 使药物变质而对使用者造成危害^[1]。然而所有的抑菌剂都具有一定的毒性^[1-5], 且抑菌剂的种类、使用剂量对多剂量鼻用制剂的质量与临床安全性有直接影响。因此, 有必要针对滴鼻液多剂量制剂中的抑菌剂开展系统分析与评价。

盐酸萘甲唑啉滴鼻液为耳鼻咽喉科用药类非

处方药品。临床适用于过敏性及炎症性鼻充血、急慢性鼻炎。目前国内的盐酸萘甲唑啉滴鼻液均属于多剂量水溶性鼻用制剂, 均添加了一定浓度的抑菌剂。然而同样的品种由于生产企业生产工艺不同, 导致选择的抑菌剂不同。因化学结构和性质不同, 抑菌剂通常被分为以下 5 种类型^[6]: 季铵盐类(苯扎溴铵、苯扎氯铵)、有机汞类(硫柳汞)、醇类(三氯叔丁醇、苯甲醇)、对羟基苯甲酸酯类(羟苯甲酯、羟苯乙酯、羟苯丙酯、羟苯丁酯等)、酸及其盐类(山梨酸钾、苯甲酸钠)。关于抑菌剂含量的检测, 国内外也有一定的研究, 检查方法有

基金项目: 湖北省食品药品监督管理局科研项目(201601017)

作者简介: 杨园, 女, 硕士, 主管药师 Tel: 13971390523
(027)65395468 E-mail: lighten1123@sina.com

E-mail: 40892110@qq.com

*通信作者: 童颖, 女, 硕士, 药师 Tel:

HPLC 和 GC^[7-11], 但同时测定本研究中硫柳汞、羟苯乙酯、苯甲酸钠、羟苯甲酯、羟苯丙酯、羟苯丁酯、山梨酸钾、苯扎氯铵和苯扎溴铵 4 类 9 种抑菌剂含量的方法暂未有文献报道。虽然大多数抑菌剂都有相应的 HPLC 检测方法, 但大部分药物的说明书并没标明使用抑菌剂的种类和剂量, 从而造成监督检验部门繁复的检验工作量和检验成本的增加。本研究建立了 HPLC 同时测定盐酸萘甲唑啉滴鼻液中 9 种抑菌剂含量的方法, 能有效提高工作效率, 降低企业的经济负担, 且能为今后制定抑菌剂质量控制的通用方法提供参考依据。

1 仪器与试剂

Waters 2695 高效液相色谱仪、二极管阵列检测器均来自美国 Waters 公司; Mettler Toledo XS105 天平、Mettler AE-200 电子天平均来自瑞士梅特勒公司。

盐酸萘甲唑啉滴鼻液[规格: 0.1%, 共 30 批, 分别来自 10 个生产企业: A、天津金虹胜利药业有限公司; B、济宁光明制药有限公司; C、河北武罗药业有限公司; D、石家庄格瑞药业有限公司; E、广东南国药业有限公司; F、国药集团三益药业(芜湖)有限公司; G、河北美图制药有限责任公司; H、湖北康正药业有限公司; I、江西珍视明药业有限公司; J、武汉五景药业有限公司], 样品信息见表 1; 硫柳汞钠对照品(1, 批号: 135050-201401; 纯度: 94.6%)、羟苯乙酯对照品(2, 批号: 100847-201604; 纯度: 99.9%)、苯甲酸钠对照品(3, 批号: 100433-200301; 纯度: 100.0%)、羟苯甲酯对照品(4, 批号: 100278-201404; 纯度: 100.0%)、羟苯丙酯对照品(5, 批号: 100404-201403; 纯度: 99.6%)、羟苯丁酯对照品(6, 批号: 110792-200503; 纯度: 100.0%)、山梨酸钾对照品(7, 批号: 101075-200901; 纯度: 100.0%)、苯扎氯铵对照品(8, 批号: 100549-201303; 含量: 12.02 mg·mL⁻¹)、苯扎溴铵对照品(9, 批号: 135051-201401; 含量: 10.9 mg·mL⁻¹)均购自中国食品药品检定研究院; 乙腈为色谱纯; 磷酸二氢钠为分析纯。

2 方法与结果

2.1 溶液的制备

2.1.1 混合对照品溶液的制备 精密称(量)取上述 1~8 对照品适量, 加水溶解并定容稀释制成混

合对照品储备液 1(浓度分别为 0.10, 0.12, 0.10, 0.30, 0.12, 0.13, 0.10, 0.35 mg·mL⁻¹); 精密称(量)取 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 对照品适量, 加水溶解并定容稀释制成混合对照品储备液 2(浓度分别为 0.10, 0.12, 0.10, 0.30, 0.12, 0.13, 0.10, 1.00 mg·mL⁻¹)。精密量取混合对照品储备液 1 2.00 mL, 置 20 mL 量瓶中, 加水稀释制成混合对照品溶液 1。精密量取混合对照品储备液 2 2.00 mL, 置 20 mL 量瓶中, 加水稀释制成混合对照品溶液 2。

表 1 样品信息

Tab. 1 Sample information

厂家	样品批号	厂家	样品批号	厂家	样品批号
A	150208	E	160614	H	160902
	160903		160615		160903
	160901		160619		160905
B	12160706	F	151216	I	160701
	12160707		160506		161001
	12160801		160606		161002
C	160305	G	141107	J	16040808
	160405		150201		16050807
	160611		150401		16050809
D	150204				
	160402				
	160802				

2.1.2 供试品溶液的制备 取盐酸萘甲唑啉滴鼻液原液作为供试品溶液(含 1, 9 的样品), 或精密量取盐酸萘甲唑啉滴鼻液 2.00 mL, 置 20 mL 量瓶中, 用水稀释至刻度, 摇匀, 作为供试品溶液(含 2, 3 的样品)。

2.2 色谱条件

采用 Ultimate XB-C₁₈ 色谱柱(4.6 mm×250 mm, 5.0 μm), 柱温 35 °C, 流动相为乙腈(A)-0.1 mol·L⁻¹ 磷酸二氢钠(磷酸调 pH 3.7)(B), 梯度洗脱(1~5 min, 25%A; 5~20 min, 25%A→55%A; 20~21 min, 55%A→75%A; 21~40 min, 75%A; 40~41 min, 75%A→25%A; 41~46 min, 25%A), 流速 1.0 mL·min⁻¹, 检测波长 222 nm, 进样量 20 μL, 样品溶液于 5 °C 避光存放。在该色谱条件下各组分分离度均>1.5, 理论板数均>5 000, 色谱图见图 1。

2.3 方法学研究

2.3.1 线性关系考察 精密量取“2.1.1”项下混

合对照品储备液 50.00, 10.00, 2.00, 1.00, 0.50 mL, 分别置于 100 mL 量瓶中, 加水定容, 即得系列混合对照品溶液。精密吸取上述不同浓度的混合对照品溶液及混合对照品储备液, 按“2.2”项下色谱条件进行测定。以峰面积 Y 为纵坐标, 溶液浓度 X 为横坐标绘制标准曲线, 进行线性回归, 线性方程、 r 和线性范围见表 2。

图 1 典型色谱图

A-混合对照品溶液 1; B-混合对照品溶液 2; 1-硫柳汞; 2-羟苯乙酯; 3-苯甲酸钠; 4-羟苯甲酯; 5-羟苯丙酯; 6-羟苯丁酯; 7-山梨酸钾; 8-苯扎氯铵; 9-苯扎溴铵; S-盐酸萘甲唑啉。

Fig. 1 Typical chromatograms

A-mixed reference solution 1; B-mixed reference solution 2; 1-thimerosal; 2-ethylparaben; 3-sodium benzoate; 4-methylparaben; 5-propylparaben; 6-butylparaben; 7-sorbic acid; 8-benzalkonium chloride; 9-benzalkonium bromide; S-naphazoline hydrochloride.

表 2 线性关系考察结果

Tab. 2 Results of linear relation

抑菌剂	回归方程	r	线性范围/ $\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$
1	$Y=5.54X \times 10^4 - 87\ 968$	1.000 0	1.13~331.48
2	$Y=1.67X \times 10^4 + 35\ 202$	0.999 6	1.40~349.25
3	$Y=7.28X \times 10^4 + 40\ 034$	0.999 9	0.38~95.30
4	$Y=2.16X \times 10^4 + 7\ 161$	0.999 9	1.22~303.75
5	$Y=3.27X \times 10^4 + 13\ 842$	0.999 9	1.20~149.40
6	$Y=1.33X \times 10^4 + 7\ 414$	1.000 0	1.34~335.60
7	$Y=2.94X \times 10^4 + 12\ 894$	1.000 0	1.14~114.20
8	$Y=1.72X \times 10^5 + 44\ 475$	0.999 8	0.24~14.42
9	$Y=2.09X \times 10^3 + 1\ 761$	0.999 5	4.00~1\ 000.00

2.3.2 精密度试验、定量限与检测限 取“2.1.1”项下混合对照品溶液 1, 2, 按“2.2”项下色谱条件, 连续进样 6 次, 记录峰面积, 计算各化合物峰面积的 RSD。将混合对照品溶液 1, 2 分别逐级稀释并进样, 计算各化合物的信噪比、检测限和定量限。结果见表 3。

2.3.3 重复性试验 取含不同抑菌剂的同一批号的盐酸萘甲唑啉滴鼻液, 按“2.1.2”方法制备 6 份供试品溶液, 分别进样 20 μL , 测得抑菌剂 1, 9, 2, 3 平均含量分别为 17.7, 84.8, 276.8, 97.4 $\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$, RSD 分别为 0.7%, 0.8%, 0.5%, 0.6%, 表明该方法重复性良好。

表 3 精密度试验结果及检测限和定量限

Tab. 3 Results of precision test, LOQs and LODs

抑菌剂	RSD/%	定量限/ $\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$	检测限/ $\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$
1	0.5	1.10	0.44
2	0.6	1.67	0.46
3	0.8	0.48	0.13
4	1.1	1.48	0.39
5	0.7	0.87	0.24
6	0.8	1.39	0.37
7	1.1	1.13	0.34
8	0.8	0.09	0.03
9	0.5	8.28	3.11

2.3.4 稳定性试验 取含不同抑菌剂的同一批号的盐酸萘甲唑啉滴鼻液(厂家 E, 批号: 160614; 厂家 D, 批号: 160802; 厂家 B, 批号: 12160801; 厂家 C, 批号: 160611), 按“2.1.2”项下方法制备供试品溶液, 分别于溶液制备后的 0, 6, 12, 24, 50 h 进样分析, 结果抑菌剂 1, 9, 2, 3 峰面积的 RSD 分别为 7.1%, 1.6%, 0.1%, 0.3%, 表明在 5 $^{\circ}\text{C}$ 避光储存条件下, 供试品溶液中的抑菌剂 1 在 12 h 内稳定, 在 24 h 内不稳定, 供试品溶液中抑菌剂 9, 2, 3 在 50 h 内稳定性良好。建议供试品溶液在 12 h 内进样分析。取“2.1.1”项下混合对照品溶液 1, 2, 分别于溶液制备后的 0, 6, 12, 24, 50 h 进样分析, 结果 1~9 峰面积的 RSD 分别为 2.0%, 1.0%, 0.6%, 1.1%, 0.7%, 0.8%, 1.1%, 1.8%, 0.8%, 表明在 5 $^{\circ}\text{C}$ 储存条件下, 混合对照品溶液中抑菌剂 1~9 在 50 h 内稳定性良好。

2.3.5 加样回收率试验 精密量取已知抑菌剂含量的盐酸萘甲唑啉滴鼻液(厂家 J, 批号: 16040808)9 份, 分别精密加入 9 个待测成分的对照品溶液, 制备成相对标示量浓度为 80%, 100% 和 120% 的加样回收溶液, 平行 3 份, 进样测定, 计算各成分的加样回收率及 RSD, 结果抑菌剂 1~9 的平均回收率分别为 100.1%, 98.9%, 100.0%, 98.2%, 99.5%, 99.9%, 98.9%, 100.6%, 100.2%, RSD 分别为 1.1%, 0.6%, 1.0%, 0.8%, 0.9%, 1.0%, 0.5%, 1.2%, 1.5%, 表明该方法准确度良好。

2.4 样品测定

取 30 批样品, 按“2.1.2”项下方法制备供试品溶液, 按“2.2”项下色谱条件分别进样 20 μL , 记录峰面积, 分别计算各成分的含量, 抑菌剂 4, 5, 6, 7, 8 均未检出, 结果见表 4。

表4 样品测定结果

Tab. 4 Sample determination result		$\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$			
厂家	样品批号	硫柳汞钠	羟苯乙酯	苯甲酸钠	苯扎溴铵
A	150208	18.2	-	-	-
	160903	17.4	-	-	-
	160901	18.0	-	-	-
B	12160706	-	270.3	-	-
	12160707	-	274.7	-	-
	12160801	-	266.2	-	-
C	160305	-	-	97.2	-
	160405	-	-	97.3	-
	160611	-	-	95.5	-
D	150204	-	-	-	84.8
	160402	-	-	-	75.4
	160802	-	-	-	74.9
E	160614	22.6	-	-	-
	160615	21.2	-	-	-
	160619	21.7	-	-	-
F	151216	86.2	-	-	-
	160506	87.9	-	-	-
	160606	89.3	-	-	-
G	141107	-	99.2	-	-
	150201	-	67.7	-	-
	150401	-	73.6	-	-
H	160902	23.7	-	-	-
	160903	23.5	-	-	-
	160905	23.4	-	-	-
I	160701	21.6	-	-	-
	161001	23.6	-	-	-
	161002	24.3	-	-	-
J	16040808	21.8	-	-	-
	16050807	25.3	-	-	-
	16050809	24.8	-	-	-

3 讨论

3.1 色谱条件优化

参考文献^[12]报道的色谱条件,比较甲醇-1%三乙胺溶液、乙腈-1%三乙胺溶液、乙腈-磷酸盐缓冲液等度洗脱和梯度洗脱,最终确定并优化梯度洗脱程序,结果表明,选用乙腈-0.1 mol·L⁻¹磷酸二氢钠(磷酸调 pH 3.7)梯度洗脱,抑菌剂 1~9 的出峰时间适宜,峰形好,各峰间的分离度均符合要求,其他成分对其无干扰。

抑菌剂 8, 9 为八、十、十二、十四、十六、十八烷基二甲基苄基氯(溴)化铵的混合物^[13],其主要成分为十二烷基二甲基苄基氯(溴)化铵,在溶液中以同一种结构存在,色谱行为相同,故本试验

将对照品分为 2 组。

3.2 检测波长的确定

采用二极管阵列检测器在 200~400 nm 内扫描“2.1.1”项下的混合对照品溶液 1, 2 中各成分的紫外吸收,抑菌剂 1 在此范围内均有紫外吸收,抑菌剂 2, 4, 5, 6 的最大吸收波长均为 254 nm,抑菌剂 3 的紫外最大吸收波长为 228 nm,抑菌剂 7 的紫外最大吸收波长为 260 nm,抑菌剂 8, 9 的紫外最大吸收波长均为 208 nm。取“2.1.1”项下的混合对照品溶液 1, 2 分别加水稀释制成抑菌剂 1~9 质量浓度分别 2.82, 3.50, 0.95, 3.04, 3.00, 3.36, 1.14, 10.00, 0.24 $\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的混合对照溶液时,按“2.2”项下色谱条件,同时在 208, 222, 228, 254, 262, 275 nm 波长下检测,记录色谱图。比较抑菌剂 1~9 在不同波长处的信噪比,检测波长在 222 nm 时,抑菌剂 1~9 的信噪比均>10,可以准确定量。因此选择 222 nm 作为检测波长。结果见表 5。

表5 样品中抑菌剂 1~9 的信噪比结果

Tab. 5 Results of S/N determination of bacteriostat 1-9 samples

Tab. 5 Results of S/N determination of bacteriostat 1-9 samples		$\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$				
抑菌剂	208 nm	222 nm	228 nm	254 nm	262 nm	275 nm
1	0.71	0.67	0.90	0.66	0.88	1.48
2	0.39	1.70	4.94	0.13	0.16	0.37
3	1.42	0.47	0.32	-	-	-
4	0.35	1.48	1.01	0.11	0.14	0.33
5	0.20	0.88	0.63	0.06	0.08	0.19
6	0.31	1.49	0.63	0.10	0.13	0.32
7	2.01	1.15	0.58	0.09	0.09	0.15
8	0.02	0.17	0.06	0.26	0.19	-
9	11.32	18.38	-	-	-	-

3.3 抑菌剂的选择

抑菌剂通常有 5 种类型,本实验中收集到的 10 个厂家就检测出 4 种不同类型的抑菌剂。在稳定性试验中发现,选择 9, 2 和 3 作为抑菌剂的样品,在 5 °C 储存条件下,供试品溶液和对照品溶液中 9, 2 和 3 的含量在 50 h 内均是稳定的。而选择 1 作为抑菌剂的样品,在 5 °C 储存条件下,供试品溶液中 1 的含量在 24 h 内下降了 12%,而对照品溶液中 1 的含量在 24 h 内稳定。有文献报道^[14-15]抑菌剂 1 化学性质不稳定,易发生降解,产生乙基汞、硫代水杨酸以及 2,2'-二硫代二苯甲酸。推测盐酸萘甲唑啉滴鼻液中盐酸萘甲唑啉与硫柳汞有

相互影响,影响机制需要下一步实验进行确证。

在鼻用制剂中合理使用抑菌剂及有效控制抑菌剂的质量,对保证鼻用制剂安全性及有效性有重要的意义^[16-17]。因此,在鼻用制剂的质量标准中,应控制抑菌剂的种类、抑菌剂的用量。同时,建议在鼻用制剂说明书中明确标明抑菌剂的种类和用量,以便更好地指导临床用药。

3.4 小结

目前国内鼻用制剂在研发过程中,对抑菌剂的合理使用和质量控制没有引起足够的重视,对抑菌剂种类和用量关注度不高^[18]。有的抑菌效力达不到中国药典标准,有的抑菌效力虽符合中国药典标准,但其抑菌剂添加量的合理性又值得深思,有抑菌剂添加过量的风险。本研究建立 HPLC 同时测定盐酸萘甲唑啉滴鼻液中 4 类 9 种抑菌剂的含量,该方法灵敏、准确、专属性强,可为制定滴鼻液中抑菌剂质量控制的通用方法提供技术支持。

REFERENCES

- [1] 中国药典. 四部[S]. 2015: 8, 151, 569.
- [2] LI K X, LEI N, SHEN F B, et al. Pharmacokinetics of thiomersal in SD rats following intravenous administration [J]. Prog Mod Biomed(现代生物医学进展), 2012, 12(3): 426-429.
- [3] HONG X X, SHE Q. The safety issue of biological products containing thimerosal [J]. Drug Stand China(中国药品标准), 2006, 7(5): 73-74.
- [4] XIAO H, LIN J H, CHEN W S, et al. Exploration of rational ethylparaben contents in chloramphenicol eye drops [J]. China Pharm(中国药师), 2014(5): 785-788.
- [5] 安彦. 眼用制剂中抑菌剂的应用与质量控制[J]. 天津药学, 2011, 23(1): 56-58.
- [6] ZHANG S L, HE Y L. Preservative for ophthalmic preparation

[J]. Food Drug(食品与药品), 2010, 12(9): 343-347.

- [7] GAO S, TANG L, ZHAO W G. Simultaneous determination of two components and preservative in Fuma nasal solution by HPLC [J]. Pharm Today(今日药学), 2017, 27(2): 83-85.
- [8] XIAO H, DAI H, YANG M Q, et al. Analysis and evaluation of bacteriostatic agent application in domestic eye drops [J]. J Pharm Res(药学研究), 2017, 36(9): 519-522.
- [9] CHEN C X, WU H W, LI L L. Investigation of preservatives in enoxacin eye drops [J]. Chin J Mod Appl Pharm(中国现代应用药学), 2018, 35(9): 1280-1283.
- [10] LI S Y, WANG Y X, LIU L, et al. Simultaneous determination of valproate sodium and preservative in sodium valproate oral solution by HPLC [J]. Chin J Mod Appl Pharm(中国现代应用药学), 2017, 34(5): 711-714.
- [11] The United States Pharmacopeial Convention. USP34: Volume 1 [M]. Baltimore: United Book Press, Inc, 2010: 142-144.
- [12] 中国药典. 二部[S]. 2015: 553.
- [13] ZHAO W Y, ZHANG Q, WU Z Q, et al. Analysis of benzalkonium bromide and benzalkonium chloride by liquid chromatography [J]. Chin J Anal Lab(分析实验室), 2015, 34(4): 471-474.
- [14] LI M G, SHI J C, ZHU S H, et al. Identification of decomposition product of thimerosal in oral vaccine by high performance liquid chromatography coupled with mass spectrometry [J]. Chin J Biol(中国生物制品学杂志), 2013, 26(7): 1019-1022.
- [15] TAN M, PARKIN J E. Route of decomposition of thiomersal (thimerosal) [J]. Int J Pharm, 2000, 208(1/2): 23-34.
- [16] NING L L. Utility and quality control of antimicrobial preservation of ophthalmic preparation during development [J]. Chin Pharm J(中国药学杂志), 2007, 42(23): 1836-1838.
- [17] SHANG Y, HAN P, XU H Y. Considerations of bacteriostatic agents in ophthalmic preparations [J]. Drug Stand China(中国药品标准), 2014, 15(1): 12-15.
- [18] ZHAO J D, QIN F, YANG Y, et al. High-throughput determination of preservatives in eye drops and antimicrobial effectiveness assessment [J]. Chin Pharm J(中国药学杂志), 2017, 52(4): 308-313.

收稿日期: 2018-11-29

(本文责编: 沈倩)