

消炎止痢灵片致严重药物性皮炎 1 例

郭虎^a, 方伟^a, 黄道秋^a, 黄亮^{b*} (重庆三峡中心医院, a.药学部, b.心血管内科, 重庆 404100)

关键词: 消炎止痢灵片; 药物性皮炎; 不良反应

中图分类号: R969.3

文献标志码: B

文章编号: 1007-7693(2020)13-1649-01

DOI: 10.13748/j.cnki.issn1007-7693.2020.13.022

引用本文: 郭虎, 方伟, 黄道秋, 等. 消炎止痢灵片致严重药物性皮炎 1 例[J]. 中国现代应用药学, 2020, 37(13): 1649.

1 病例资料

患者, 男, 60 岁, 2018 年 8 月 4 日无明显诱因出现水样稀便, 无黏液、脓血, 无畏寒发热、恶心呕吐, 遂自行购买消炎止痢灵片治疗(1.6 g po st), 30 min 后即出现全身散在红斑, 并迅速出现水疱, 伴皮损处疼痛、瘙痒, 立即停用该药, 至当地医院予“地塞米松、维生素 C”等药物治疗(具体用法用量不详), 颈部皮损逐渐消退, 外阴出现糜烂、渗出, 剑突下疼痛, 进食后呃逆, 病程中无畏寒发热、咳嗽咳痰、腹痛腹泻等不适。为求进一步治疗, 2018 年 8 月 12 日至重庆三峡中心医院就诊, 以“药物性皮炎”收入住院治疗。入院后予以注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 80 mg ivgtt qd, 富马酸酮替芬片 1 mg po bid, 枸地氯雷他定片 8.8 mg po qd, 丙酸倍他米松乳膏外用 bid, 注射用奥美拉唑 40 mg ivgtt qd 治疗。2018 年 8 月 14 日, 患者背部、下肢、双手散发鸡蛋大小紫红色斑片, 水疱破溃结痂, 颈部见紫红色素沉着及脱屑, 外阴血性渗出减少, 伴有少量痂壳。2018 年 8 月 19 日, 患者未诉瘙痒不适, 躯干、四肢可见散在片状暗红斑, 未见水疱等, 外阴未见红斑及抓痕等, 好转出院。

2 讨论

本例患者发生的皮炎与服用消炎止痢灵片有明确的时间关系, 该时间段患者未使用过其他药物, 停用该药后经过治疗症状较前明显好转, 采

用 Narajo's 量表进行客观评估评价, 总得分为 5 分, 基本可以判定该患者的严重皮炎由消炎止痢灵片所诱发。

以“消炎止痢灵片”“不良反应”为检索词, 检索 PudMed、CNKI、万方医学数据库, 结果显示未见消炎止痢灵片诱发药物性皮炎或皮疹的不良反应报道。该药为处方药, 成分由苦参、甲氧苄胺嘧啶组成, 说明书中不良反应标注为“尚不明确”。苦参引起的药疹临床相对少见, 现有不良反应的报道多集中于苦参注射液, 不良反应的临床表现主要为过敏性休克、恶心、呕吐等全身性损害, 其次才是皮肤瘙痒、静脉炎等皮肤及其附属器的损害。甲氧苄胺嘧啶为磺胺类抗菌药物, 该药及该类物质引起药物性皮炎已经有文献报道, 主要表现为皮疹、静脉炎, 主要机制主要与其 N1 位杂环取代基和 N4 位芳香胺取代基有关。

消炎止痢灵片含有甲氧苄胺嘧啶成分, 应引起广大医务人员警惕, 加强对该药用药安全教育。该药为处方药, 患者应凭医师处方购买, 并按医嘱用药。医师开具或药师调配该药时应询问患者过敏史, 特别询问有无磺胺类药物过敏史, 嘱患者用药后观察有无皮疹、瘙痒、水疱等不良反应, 若出现上述症状应立即停用该药, 多饮水, 加速药物排泄, 并及时就医。

收稿日期: 2019-12-09

(本文责编: 李艳芳)

基金项目: 重庆市万州区科技计划项目(wzstc-2017002)

作者简介: 郭虎, 男, 硕士, 主管药师 Tel: (023)58103233
(023)58104057 E-mail: 254975204@qq.com

E-mail: 420827286@qq.com

*通信作者: 黄亮, 女, 主治医师

Tel: