

· 综合报导 ·

感冒通的不良反应

於雅尔 (杭州医药站新特药分公司, 杭州 310006)

感冒通是一消炎、解热、镇痛药, 主要成份: 双氯灭痛、人工牛黄、扑尔敏, 其中双氯灭痛的消炎解热作用比吲哚美辛强2—2.5倍, 比乙酰水杨酸强20—50倍, 特点为药效强、剂量小、个体差异小、不良反应少, 口服吸收迅速、排泄快、长期应用无蓄积作用^[1], 因感冒通疗效确切, 价格便宜, 临床和社会(自我治疗方法)应用广泛, 因此不良反应的发生有所增加, 笔者就有关文献资料综述如下:

1 胃肠道反应^[2]

较常见的有恶心、呕吐, 厌食, 消化不良、腹痛等、还观察有急性胃炎、消化道出血、溃疡等。

2 泌尿道系统的影响:

2.1 血尿: 据宫伟星等报道^[3], 应用感冒通出现33例血尿, 他们均是因呼吸道感染高热时应用感冒通发生的, 血尿均较严重, 31例出现肉眼血尿, 即停用感冒通, 给予止血、补液后血尿很快消失, 因此提示为药源性血尿、丁培植报道^[4]: 感冒通引起血尿10例, 对其中使用剂量大而出现严重血尿的4例住院患儿, 做血尿B₂M测定结果4例尿B₂M均明显升高, 提示此4例肾小管功能损害, 证实血尿是口服感冒通所致, 另据周铁英等报道^[5]: 感冒通致小儿血尿6例。

2.2 致急性肾衰:

贾晓英等报道^[6]: 两例(男、女各一例), 其中一名因感冒发热无力、口服感冒通2片, Tid共5d出现恶心、腰痛, 全身浮肿, 24h尿量少于40ml 肾区触痛(+), 叩痛(+), 检查: Hb 89g/L, 尿常规d 1.009、蛋白(卅)、WBC满视野、RBC满视野、颗粒管型均0—1个、尿渗透压400mmol/L、Scr 56μmol/L、Ccr 12.1 ml/min Co₂CP 15.09 mmol/L, B超: 右肾偏大、皮质回声增加, 诊断为感冒通所致急性肾衰。

3 药物性黄疸:

邢伟报道:^[7]秦×、男、74岁、因感冒服感冒

通2片 Tid、服药后2天, 病人出现血尿和黄疸, 全身皮肤巩膜都呈黄色、体查: 一般良好, 查尿: 红细胞卅、病人停用感冒通、第二天黄疸开始消失、血尿好转。

4 严重过敏反应:

据贾殿秀报道:^[8]二例病人均因服感冒通后即感眼睛发胀, 刺痛, 喘憋, 恶心、呕吐、全身皮肤迅速出现皮疹水肿, 由潮红色渐变为青紫色, 口唇外翻、发病约5min后, 呼吸停止, 经抢救后, 呼吸恢复、水肿消退、过去病人曾单独服扑尔敏、牛黄解毒片无此反应。

感冒通不良反应的发生除与病人个体差异有关外, 胃肠道反应较为多见、血尿发生也常见, 特别是儿童服感冒通其血尿发生率比成人较为多见、其过敏反应较为少见、临床上凡年老体弱, 儿童、孕妇等均应慎用。

参 考 文 献

- 1 陈新谦. 新编药理学. 北京: 人民卫生出版社 1992; 164
- 2 王士凡等. 药物不良反应. 北京: 人民卫生出版社, 1992; 315
- 3 宫伟星等. 感冒通引起血尿33例分析. 中国医院药学杂志, 1994.14(6); 283
- 4 丁培植. 感冒通引起血尿10例. 中级医刊, 1993. 2; 50
- 5 周铁英. 苏海涛. 感冒通致小儿血尿6例. 临床儿科杂志, 1993.1; 45
- 6 贾晓英等. 感冒通致急性肾衰2例. 中国医院药学杂志, 1995.15(3); 142
- 7 邢伟. 感冒通不良反应2例. 中国医院药学杂志, 1994.14(9); 393
- 8 贾殿秀. 韩文玲. 服用感冒通致严重过敏2例报告, 中国药学杂志, 1992.27(11); 697

收稿日期: 1995—07—24