

• 安全用药 •

希普欣注射液过敏反应 3例

黄福珍 黄春林 (四川省人民医院, 成都 610072)

希普欣注射液又名环丙沙星(Ciprofloxacin)注射液。我院门诊内科治疗室, 应用广州侨光制药厂生产的希普欣注射液(批号95052403, 包装、200 mg/100 ml), 出现过敏反应3例, 其中休克1例, 报告如下。

例1 患者女, 25岁, 因慢性胆囊炎急性发作就诊。给予希普欣400 mg 静脉滴注。滴注约5 min后, 病人滴注侧手臂发红、瘙痒, 继而头颈部发红, 全身不适, 呼吸急促、头昏、喉头阻塞感, 四肢发冷、面色苍白。考虑为药物过敏性休克, 立即停止输液, 皮下注射肾上腺素1 mg。约10 min后, 症状逐渐缓解, 1 h后能起床走动。给口服扑尔敏等药, 并改用其它抗菌素治疗。经询问得知, 该病人对青霉素等多种药物有过敏史。

例2 患者女, 36岁, 因腹痛腹泻就诊。以急

性胃肠炎, 给予环丙沙星静脉滴注, 每次200 mg(100 ml), 滴入约30 ml, 病人感到口干、头晕、全身不适, 烦躁, 头颈及胸部出现散在性皮疹。停止输液, 给予口服息斯敏、维生素C等处理; 卧床休息, 2 h后症状缓解, 皮疹逐渐消失, 恢复正常。

例3 患者男, 60岁, 因反复咳嗽多年, 加重1周, 诊断为慢性支气管炎。处方给予静脉滴注环丙沙星400 mg, 每日1次。滴注约10 min, 输液的左手背进针部位起沿静脉走向, 出现红肿, 并伴轻微痛性瘙痒, 但未有其它不适。在严密观察下, 继续输完400 mg(200 ml)。次日病人左手臂红肿完全消失; 换用右手输液, 约10 min, 上述症状又出现。该病人连续输药5天, 除上述手臂局部红肿外, 未见其他不良反应发生。

收稿日期: 1996—03—01