

施尔康引起过敏反应1例

孟建平 叶长青 (山东省东阿县人民医院, 东阿 252201)

患者, 男, 13 a, 1995年3月5日诊。全身扁平丘疹, 搔痒3 d。4 d前因患者自幼体质虚弱, 易感冒咳嗽服用施尔康作为预防保健用药, 1片/d, 顿服。药后d2自感皮肤搔痒, 但未予注意。服至d3, 在搔痒的同时, 全身出现扁平丘疹, 而来院诊治。查体除丘疹外, 未见其他异常, 既往无过敏史, 考虑系服用施尔康所致。即令其停药, 予以一般抗过敏治疗, 1 d后皮疹搔痒消失。愈后其母又令其继续服用施尔康, 上述症状再次出现。嘱其完全停止服用, 并再次抗过敏治疗, 皮疹搔痒消失后未再出

现。

讨论: 患者多次服用施尔康, 重复出现皮疹搔痒等症状, 显然系口服施尔康过敏所致。施尔康是由多种维生素及微量元素制成的营养补充药, 用于预防因维生素和微量元素缺乏引起的各种疾病。由于其成份繁杂, 究竟由何种物质引起的过敏, 目前尚难作出明确判断。然而也正是因为其药物成份较多, 对不同体质的患者引起过敏的可能性就越大, 提示临床应引起我们的注意。

收稿日期: 1995—11—13