

口服非普拉宗片致过敏性紫癜 1 例

张伟 银建军 (山东省济宁市第一人民医院神经内科 济宁 272111)

患者女,29a,因腰部扭伤服用非普拉宗片(济南金泰制药厂生产,批号 961207),0.2/次,2次/d。服药 3d 后感双前臂皮肤瘙痒,未引起注意,继续服药 1d,瘙痒加重并波及全身,皮肤表面出现粟粒样紫红色出血点,边界清楚,稍高起皮肤,遂停药。次日晨出血点扩大,在前臂及胸背部出血点融合成片,奇痒难忍,未感腰痛及关节疼痛。查体:青年女性,心肺听诊正常,腹软,全腹无压痛,全身皮肤遍布紫红色片状出血斑,双前臂及胸背部已融合成片,高起皮肤,压之不退色,部分已被抓破,少许渗血;四肢活动好,关节无压痛。既往无药物过敏史。实验室检查:血常规:白细胞 $9.8 \times 10^9/L$,中性 0.8,淋巴 0.2,尿常规正常,肝功、肾功正常。诊断:过敏性紫癜。治疗:停药非普拉宗,给 GNS500ml + Vitc2.0 + 地塞米松 10mg

静滴,GNS20ml + 葡萄糖酸钙 10ml 静推,均每日一次,口服扑尔敏、敏迪,一周后皮肤紫癜逐渐消退,继续服药一周,症状完全消失,随访一个月,患者身体健康。

非普拉宗为非甾体类消炎镇痛药物,目前临床应用较广泛,据说明书所述,其不良反应较少,偶有轻度消化道症状或皮疹,停药后即可恢复。该患者服药后 3d 出现皮肤出血点,继续服药后出血点扩大并形成紫癜,中间未服其它药物,既往无过敏史,故可认为患者皮肤过敏性紫癜为服用非普拉宗所致。由于目前尚未见类似报导,故提请临床工作者注意,避免误诊。

收稿日期:1997—08—06