

头孢噻肟钠引起皮疹 1 例

张春英(天台 317200 浙江天台人民医院)

患者女,50岁,因左手背部多处损伤来院就诊。经清创后,为了预防和控制感染,给静脉滴注 5% GS 250ml,头孢噻肟 2g(南方制药厂深圳九新药业有限公司,批号 970109)每天 2 次。第三天上午输液时,患者脸部感觉轻度灼热,伴发痒,当时未引起重视,下午继续静滴,大约半小时左右,患者感觉周身不适,烦躁不安,皮肤潮红,奇痒,面部、胸部、四肢等处出现大小不等淡红色皮疹,融成片状,压之退色,伴眼睑水肿,余无殊。在此期间,患者未用过其它药物,被诊为头孢噻肟

过敏。停头孢噻肟,即给 50%GS 20ml,地塞米松 10mg,静脉推注,肌肉注射异丙嗪 25mg,口服赛特赞,维生素 C 等抗过敏治疗。症状减轻,二天后皮疹消退,无色素沉着。

本例是我院在使用头孢噻肟过程中,所发生的 1 例典型的过敏病例。目前,头孢噻肟的应用日益广泛、普遍。所以对此药的不良反应,应引起足够的注意和重视。

收稿日期:1997-09-19