

洁尔阴泡腾片致接触性皮炎 12 例

谢萍芳 蒋 珉(嘉兴 314000 嘉兴市妇保院)

1996 年 6 月 17 日~7 月 14 日,我们在门诊妇科的 95 例病从中使用了洁尔阴泡腾片,引起接触性皮炎 12 例,其中 3 例为较严重的接触性皮炎。

在为 95 例门诊妇科病人的检查及阴道涂片化验中,诊断为宫颈炎、附件炎和阴道炎的有 24 例,71 例为滴虫性、霉菌性阴道炎,年龄均在 22~56 岁,给予洁尔阴泡腾片(成都恩威制药有限公司,批号:950212),在使用过程中,其中 33 例为 1d/次,每次放二片,7d 为一疗程。另 62 例病人为 1d/次,每一次放一片,14d 为一疗程。12 位病人用药 1~2d 后,发现阴道内壁红肿,病人感觉阴道内有烧灼感,疼痛瘙痒加重,其中 3 例病人出现疼痛,瘙痒不止,阴道四周红肿及针尖大红丘疹,阴唇两侧,尿道口水肿,外阴糜烂渗水,甚至行走困难,诊

断为药物接触性皮炎,立即停用洁尔阴泡腾片,给予抗过敏等对症治疗,24h 红肿消失,瘙痒减轻,3d 后所有症状消失。

讨论:洁尔阴泡腾片由蛇床子、艾叶、独活、石菖蒲、苍术、泡腾赋形剂等成份压片制成。该药对革兰氏阳性和阴性菌均有一定的抑菌作用,对阴道的霉菌、滴虫亦有抑制力,还有较好的抗炎作用。临床使用后部分病人有灼烧感外,其不良反应国内报道也只限于个别人,在 95 例病人中发生 12 例不良反应的报道甚少。出现上述症状,笔者和临床医师认为可能与洁尔阴泡腾片的剂量,局部浓度有关,泡腾赋形剂等成份与区域性人的个体差异有关,在使用时应注意。

收稿日期:1998-05-25