

参麦注射液致皮疹 1 例

张有梨 王香华(西安 710100 西安市长安区医院)

患者男,50岁。于1998年11月18日以急性下壁心肌梗塞合并多发性室性早博急诊入院。既往无药物过敏史。经常规治疗1周后病情稳定。加用10%葡萄糖250ml+参麦注射液[中外合资,正大青春宝药业有限公司,浙卫药准字(1996)第031301号]20ml(2支)静脉点滴,每日一次。当日输液后即出现胸、背、腹部及四肢近端大片针尖大小皮疹,呈淡红色,奇痒。给口服扑尔敏治疗。第2天继续同前量用药一次,发现皮疹加重。考虑到皮疹为加用参麦注射液后出现,立即停用该药,其它药物不变。继续服用抗过敏药对症治疗。

1周后皮疹消失。

讨论:本例患者既往无药物过敏史,发病后常规治疗病情稳定。加用参麦注射液点滴,当天出现皮疹反应。第2天继续用药皮疹加重。停用参麦注射液,余药不变同时加用抗过敏药物后皮疹逐渐消失。可确定为参麦注射液过敏反应。参麦注射液是近年广泛用于临床的纯中药制剂,多有报导其对改善心功能有显著疗效。本例则出现大片皮疹过敏,可供同行用药时参考。

收稿日期:1999-05-28