

颠茄酞合剂致全身过敏性荨麻疹 1 例

周永治 王顶盛(宁波 315812 宁波大榭开发区医院药剂科)

患者女,44 岁。于 1999 年 6 月 8 日晚上 22 时,因胃脘部疼痛来我院就诊,体格检查:体温 36.7℃,脉搏 72 次/min 呼吸 19/min,血压 16/10KPa,心肺听诊阴性。腹部平软无压痛,患者平素体健,无其它病史和用药史。无乙醇、无药物过敏史。

因患胃脘痛故而服用颠茄酞合剂 10ml(规格 10ml 含颠茄酞 0.5ml 加水配成含酞剂 5%,批号 970904,广州星群(药业)股份有限公司)药液口服。口服后约 1 小时,患者有烧灼感,面色及全身潮红。全身发痒难忍,继而感胸闷,呼吸困难,心悸,大汗淋漓,及出现风疹团块遍及全身等症状。

查:心率 90 次/min, BP13.5/8KPa,神清。即给静注 50%GS 20ml。加 10%葡萄糖酸钙 10ml,加地塞米松 10mg。肌注非那更 25mg。20 分钟后,上述症状逐渐缓解至正常。

讨论:颠茄酞合剂,属茄科植物颠茄中提出的生物碱(主要是莨菪碱)约 0.3%。其主要药理作用为外周及中枢作用两方面。临床主要利用其外周作用,解除由胃肠道平滑肌痉挛所致的各种内脏绞痛、解痉等治疗。本例仅用于解痉口服治疗,即引起全身性过敏性荨麻疹者实属罕见,故予报告,以引起同行注意。

收稿日期:2000-01-19