

静脉滴注头孢哌酮钠致过敏反应 11 例

王先敏 曹高忠(温州 325000 温州医学院附属第一医院药剂科)

头孢哌酮为第 3 代头孢类抗生素,抗菌谱广,疗效好,临床主要用于敏感菌引起的各种感染,如尿路感染、呼吸系统感染、脑膜炎、败血症、皮肤及软组织感染等。我院脑外科在使用同一批(齐鲁制药厂,批号:99100055)头孢哌酮钠针剂时发生 11 例过敏反应,现报告如下。

对象为性别、年龄、病种不相同的住院患者,均无青霉素过敏史,手术后给予头孢哌酮钠针剂 4g 加入 5%GS 500ml 中静脉滴注,qd,用药 2~4d,陆续出现皮肤反应症状,患者自觉全身瘙痒,发热,皮肤出现米粒

大小红色丘疹或麻疹样红斑,逐渐融合成片,躯干及四肢多见,继而泛发全身。处理:立即停止输液,轻者给予抗组胺药口服,息斯敏片 10mg,qd,扑尔敏片 4mg,tid,强的松片 5mg,tid,po。重者给予静脉滴注 10%GS 500ml,Vitamin C 2.0,地塞米松 5mg,qd,治疗 2~5d 后,瘙痒明显减轻,症状逐渐消失至正常。

患者无药物过敏史,但在用药过程中都出现瘙痒及皮疹,说明是此药引起的过敏反应,在使用该药时应引起注意。笔者认为可能与个体差异或机体的免疫有关,致敏的机理有待于进一步探讨。