

卡介菌多糖核酸注射液引起严重腹泻 1 例

申国庆(南京 210042 中国协和医科大学,中国医学科学院皮肤病医院)

患者男,20岁。因皮肤手指缝、腹股沟、大腿内侧有针头大小的丘疹,有的呈小水疱,瘙痒;阴茎处有粟粒大小的丘疹,有的呈小乳头状。于2000年6月份来我院就诊,经临床检查阴茎处皮损诊断为尖锐湿疣,5%醋酸白试验为阳性;其它处皮损诊断为疥疮,属螨虫侵入皮肤而引起。临床处置给予中药皮肤康洗剂清洗皮损,疥灵霜用于治疗疥疮,氧氟沙星凝胶用于皮损破溃处。另采用激光和肌注卡介菌多糖核酸注射液(商品名为斯奇康,规格为0.5 mg/ml,湖南九芝堂股份有限公司,批号为:20000318),每次2 ml,隔日一次,联合治疗尖锐湿疣。患者首先肌注卡介菌多糖核酸注射液,尚未进行其它治疗。肌注3h后,患者开始出现发热,体温38℃,头昏,后又出现呕吐2次和腹泻,为稀水样便,连续3次,患者面色苍白,出冷汗,全身乏力。该反应持续14h后消失,此期间,患者未用药物治疗,并自述未饮用不洁食物。患者拒绝再次

使用卡介菌多糖核酸注射液。

讨论:卡介菌多糖核酸注射液是1999年新上市的生物制剂,具有调节机体内的细胞免疫、体液免疫、刺激网状内皮细胞、激活单核-巨噬细胞功能来增强机体抗病能力。主要用于治疗慢性支气管炎、病毒性及变应性疾病等。作为生物制剂,该说明书列出的不良反应主要是急咳和低烧现象,但未有引起腹泻的不良反应报道。该不良反应的出现值得引起重视。

本例患者用药前未出现发热、腹泻等症,在用药后发生这些反应可说明是卡介菌多糖核酸注射液所致。生物制品发生不良反应的原因是多方面的,该病例是否与首次使用剂量超出说明书的每次1 ml用量,因剂量过大引起不良反应有关,有待探讨。

收稿日期:2000-08-07