

静滴双黄连致皮肤过敏 18 例

陶美娣 (绍兴 312030 绍兴第四医院儿科)

我们自 1999 年 8 月至 2000 年 4 月遇到静滴双黄连致皮肤过敏的病人 18 例, 其中男 7 例, 女 11 例, 年龄 3 月~ 1 岁 6 例, ~ 3 岁 8 例, ~ 8 岁 4 例。原发疾病均为上呼吸道感染。其中 15 例分别有哮喘及药物、食物等过敏史。双黄连粉针剂 (由哈尔滨松花江制药厂生产, 批号 990710) 按常规剂量 $60\text{mg}/\text{kg}\cdot\text{d}$, 溶于 5~ 10% 葡萄糖溶液静滴, 浓度 $< 1.0\%$, 滴速为 $0.5\sim 1\text{ml}/\text{min}$ ($10\sim 20$ 滴/ min)。过敏反应多发生在用药后 $10\sim 20\text{min}$ 。全部病例均出现不同程度荨麻疹, 轻者仅局部出现荨麻疹, 重者出现全身皮肤发红, 搔痒, 眼睑部浮肿, 并同时出现胃肠道及胸闷不适等反应。一旦发生上述情况, 立即停止注射, 并同时应用地塞米松、抗组胺药及葡萄糖酸钙, 约半小时内症状迅速缓解。另有 5 例患者再次应用双

黄连粉针后又出现全身荨麻疹, 即予以地塞米松静推, 症状迅速缓解。

双黄连粉针是由金银花、连翘、黄芩组成, 具有清热解毒, 轻宣透邪的作用。尚有大量实验证明毒副作用较小, 具有抗菌和抗病毒及使细胞免疫功能增强的作用, 因而广泛应用于临床, 其发生过敏反应的机理, 是由于双黄连颗粒静滴入体内后作为半抗原成份, 从而引起 I 型及 III 型变态反应, 并出现相应的症状体征。严重者曾有静滴双黄连致过敏性休克的报道。因此, 双黄连致皮肤过敏认为与其剂量、滴速、疗程及药理作用无关, 而与患者的个体差异密切相关。在应用双黄连制剂时应注意对特殊体质患儿谨慎使用。

收稿日期: 2000- 06- 14