

· 不良反应 ·

拜心同致急性尿潴留 1 例

张秀华(浙江省温州医学院附属一院,浙江 杭州 325000)

中图分类号:R972.4;R694.55

文献标识码:B

文章编号:1007-7693(2003)05-0431-01

患者,男,68岁。因尿毒症于1999年2月13日行肾移植术,术后一直口服三联免疫抑制剂:泼尼松片、环孢素A胶囊、硫唑嘌呤,同时联用的药物有抗高血压药硫氮萘酮缓释片和治疗前列腺炎的保列治片。患者因高血压曾先后服用过硝苯地平片、可乐定片、氨氯地平(络活喜)片、贝那普利(洛汀新)片和哌唑嗪片。曾因服用络活喜片后双踝部水肿而停用。自2001年3月,患者一直联用洛汀新片10mg/qd,哌唑嗪片0.15mg/qid及可乐定片0.75mg/tid降压治疗,血压维持在120~130/85~90mmHg。2001年10月20日因血

压升高而遵医嘱于下午2:00服拜心同片1片,次日晨8:00未解小便,遂自行服用氢氯噻嗪(双氢克尿噻)片半粒(剂量25mg),仍未见有小便,于下午1:00加服呋塞米(速尿)片和安体舒通片各1片(剂量均为20mg),即有小便,为了解是否为拜心同所致,d3再次使用拜心同片同样剂量,再次出现无尿,同样处理办法才缓解症状。拜心同片即硝苯缓释片,在硝苯定的不良反应中无此报道,故望使用者慎用。

收稿日期:2002-04-26