

维生素 K₁ 致过敏性休克 1 例

时彩燕, 王海燕, 姜元芳 (威海市文登中心医院, 山东 威海 264400)

中图分类号: R994.11

文献标识码: B

文章编号: 1007-7693(2005)06-0519-01

患者男, 50 岁, 因肝癌入院。遵医嘱给予维生素 K₁ 20mg, 止血敏 500mg 加入 5% 葡萄糖 500mL 内静滴。5min 后患者出现胸闷、出冷汗、意识丧失、小便失禁、血压测不到。立即停药, 吸氧, 静注地塞美松 10mg, 葡萄糖酸钙 10mL 和生理盐水 20mL 等处理, 10min 后症状缓解, 意识恢复正常。15 日后遵医嘱给予维生素 K₁ 40mg 和生理盐水 20mL 静脉注射, 速度缓慢, 约 5min 患者再次出现胸闷、出冷汗、血压测不

到, 立即停药、吸氧、静注葡萄糖酸钙 10mL 和生理盐水 20mL 等处理, 5min 后症状缓解。诊断: 维生素 K₁ 过敏。维生素 K₁ 毒性低, 静脉注射速度快时, 可产生面部潮红、出汗、血压下降, 甚至发生虚脱。但发生过敏性休克很少见, 提示医护人员对常规用药也要密切观察, 发现异常, 及时处理。

收稿日期: 2005-01-12