

泻痢停致严重不良反应 1 例

吴萍 (甘肃省白银市第一人民医院药剂科, 甘肃 白银 730900)

中图分类号: R994.11

文献标识码: B

文章编号: 1007-7693 (2009) 05-0431-01

患者, 男, 46 岁。因尿道口周围肿胀、疼痛 2 d 于 2008 年 8 月 6 日入院, 患者近日未服其他药物, 既往有喹诺酮类药物过敏史。2 d 前因腹泻自服泻痢停 (哈药集团制药六厂, 批号: 080637) 2 片, 约 10 min 后自觉尿道口周围出现肿胀、红肿、疼痛, 约 3 h 后疼痛肿胀加重, 尿道口周围皮肤、黏膜出现糜烂有大量白色分泌物渗出, 搽之有少量的渗血, 患者既往社区诊所就诊, 给予地塞米松注射液 5 mg、维生素 C 注射液 2.0 g、10% 葡萄糖酸钙注射液 10 mL, qd 静脉推注 2 d, 症状无明显缓解, 分泌物增多, 且包皮难以上翻, 活动时疼痛加剧, 2 d 后到医院就诊, 诊断: 磺胺过敏。入院查体: T 36.2 °C, P 100 次·min⁻¹, R 20 次·min⁻¹, BP 135/90 mmHg; 阴茎水肿, 包皮难以上翻, 尿道口红肿, 局部见白色分泌物, 量较多, 肛门正常; 无尿急、尿痛、尿频, 无发热、寒战, 无脓尿、肉眼血尿。血常规: WBC $13.3 \times 10^9 \cdot L^{-1}$, N 76.0%, RBC $522 \times 10^{12} \cdot L^{-1}$ 。尿常规: WBC $16.2 \cdot \mu L^{-1}$, RBC $1.7 \cdot \mu L^{-1}$ 。入院第 1 天给予 10% 葡萄糖酸钙注射液 20 mL 加 5% 葡萄糖

注射液 100 mL, qd 静脉滴注 7 d; 维生素 C 注射液 2.0 g、地塞米松注射液 20 mg 加 5% 葡萄糖注射液 250 mL, qd 静脉滴注 3 d; 0.1% 依沙吖啶溶液、肤创宁阳离子溶液, 外用 7 d。第 2 天给予磷霉素 4.0 g 加 0.9% 氯化钠注射液 250 mL, bid 静脉滴注 6 d。8 月 13 日尿道口周围皮肤糜烂愈合, 肿胀、疼痛等症状基本消失, 阴茎恢复正常, 病情痊愈出院。

泻痢停是止泻止痢药物, 具有高效、速效、疗效稳定, 经济方便等优点。含活性成分磺胺甲噁唑、甲氧苄啶、颠茄流浸膏, 其活性成分中复方磺胺甲噁唑过敏反应较为常见, 可表现为药疹, 严重者可发生渗出性多形红斑、剥脱性皮炎和大疱表皮松解萎缩性皮炎等; 也有表现为光敏反应、药物热、关节及肌肉疼痛、发热等血清病样反应; 偶见过敏性休克; 曾有报道服用泻痢停, 发生龟头红肿、溃疡化脓等过敏反应。预防措施: 用药前应了解药物的活性成分, 认真询问有关过敏史, 避免再次发生不良反应。

收稿日期: 2008-09-27

作者简介: 吴萍, 女, 主任药师

Tel: (0943) 8812150

E-mail: bydywuping@sina.com