HPLC 法测定延胡索中延胡索乙素的含量

龚 青 周 蒂¹ 王碧娟²(杭州 310004 浙江省药品检验所;²海南养生堂药业公司;²浙江中医学院 98 毕业实习生)

摘要 目的:对延胡索中的延胡索乙素进行含量测定。方法:采用 HPLC 法,以 C₁₈-ODS 为色谱柱,甲醇-0.1%磷酸(用三乙胺调 pH 至 6.0)(60:40)为流动相,检测波长为 280nm。结果:延胡索乙素的量在 0.257~2.056 μ g 范围内线性良好,回收率为 99.03%,RSD 为 0.51%。结论:该方法简便、可靠,适合延胡索的质量控制。

关键词 延胡索;延胡索乙素;HPLC;含量测定

Assay of tetrahydropalmatine in yanhusuo by HPLC

Gong Qing(Gong Q) ,Zhou Di(Zhou D) , Wang Bijuan(Wang BJ) (Zhejiang Institute for Drug Control , Hangzhou 310004)

ABSTRACT OBJECTIVE: To determine the content of tetrahydropalmatine in the yanhusuo. **METHODS:** HPLC method was selected to determine the content. The separation was performed on an analytical C₁₈-ODS column. The mobile phase was methanol-0.1% phosphoric acid (adjusted to PH 6.0 with triethylamine) (60:40). The UV detector was set at 280nm. **RESULTS:** The calibration curve of tetrahydropalmatine was linear between 0.257~2.056 μ g. The average recovery was 99.03% with RSD 0.51%. **CONCLUSION:** This method was proved to be simple and reliable, and can be used for the quality control of yanhusuo.

KEY WORDS tetrahydropalmatine ,yanhusuo ,HPLC ,assay

延胡索为罂粟科紫堇属植物延胡索 (Corydalis yanhusuo W.T. Wang) 的块茎。其主要成分为延胡索甲

素、乙素、丙素、丁素、戊素、辛素、壬素、癸素、子素、丑素、寅素、卅高白屈菜碱、黄连碱、延胡索胺碱等。其中

以延胡索乙素 (tetrahydropalmatine) 的镇痛作用较强^[1]。延胡索乙素测定方法有分光光度法^[2]、薄层扫描法^[3,4]、旋光法^[5]、荧光法^[6]等。本文采用高效液相色谱法测定了延胡索乙素的含量,方法简便、准确,重现性好。

1 仪器与试剂

Shimadzu LC-10A 型高效液相色谱仪, Shimadzu SPD-10A 紫外检测器, Shimadzu C-R7A 色谱处理机。

延胡索乙素对照品(中国药品生物制品检定所), 延胡索(浙江), 所用试剂均为分析纯。

2 色谱条件

流动相: 甲醇-0.1%磷酸(用三乙胺调 PH 至 6.0) (60:40), 色谱柱: Shim-pack CLC-ODS C₁₈(0.15 m × 6.0 φ), 流速: 1.0 ml/min, 波长: 280 nm, 纸速: 2 mm/min, 进样量: 20 μl。

3 线性关系的考察

精密称取五氧化二磷减压干燥过夜的延胡索乙素对照品 25.7 mg, 置 100 ml 量瓶中, 加甲醇溶解并稀释至刻度, 摇匀, 作为对照品溶液。分别吸取对照品溶液 1, 2, 4, 6 和 8 μl 进行分析, 以峰面积为纵坐标, 以对照品的量(μg)为横坐标, 绘制标准曲线(见图 1), 其回归方程为: $Y = 704.7 + 808363.6 X$, $r = 0.9999$ 。表明延胡索乙素在 0.257 ~ 2.056 μg 之间具有良好的线性关系。

图 1 延胡索乙素标准曲线图

4 回收率实验

采用加样回收率法, 精密称取已知含量的延胡索样品 1 g, 分别精密加入适量延胡索乙素对照品, 按“样品测定”相下操作, 结果见表 1。

表 1 回收率试验结果

样品号	样品延胡索乙素的量/ mg	加入延胡索乙素的量/ mg	测得延胡索乙素的量/ mg	回收率 / %	平均回收率
1	0.4231	0.5045	0.9255	99.58	99.03 % RSD = 0.51 %
2	0.4223	0.5045	0.9241	99.46	
3	0.4232	0.5045	0.9203	98.53	
4	0.4350	0.5045	0.9363	99.37	
5	0.4298	0.5045	0.9286	98.87	
6	0.4325	0.5045	0.9289	98.39	

5 精密度试验

取延胡索乙素对照品, 用甲醇制成每 1 ml 中含 40 μg 的溶液, 精密吸取 20 μl 重复进样 6 次, 测峰面积, 计算 RSD 为 0.39%。

6 重现性试验

精密称取样品 2g, 按“样品测定”相下操作, 在相同条件下测定同一批号样品 6 份, 计算含量, 其 RSD 为 1.25%。

7 样品含量测定

精密称取样品 2g, 置锥形瓶中, 精密加入甲醇 20 ml, 称定重量, 超声处理 30 min, 冷却, 称重, 加甲醇补足重量, 用微孔滤膜过滤, 精密吸取 20 μl 注入色谱柱, 按外标峰面积法计算延胡索乙素的含量, 结果见表 2。其 HPLC 图谱见图 2, 3。

表 2 延胡索乙素含量测定结果

样品号	每 g 含延胡索乙素/ mg	样品号	每 g 含延胡索乙素/ mg
1	0.387	6	0.594
2	0.517	7	0.402
3	0.614	8	0.621
4	0.659	9	0.626
5	0.425	10	0.485

图 2 延胡索乙素对照品 HPLC 图

1 - 延胡索乙素

图 3 延胡索样品 HPLC 图

8 结果与讨论

8.1 提取溶剂和时间的选择 以甲醇、乙醇、乙醚为溶剂,分别超声处理 20,30 和 40 min,实验结果表明,用甲醇超声处理 30 min 可提取完全。

8.2 稳定性考察 取延胡索乙素对照品,在 0,0.5,1,3,5,7 和 24h 分别测定,其 RSD 为 1.2%,说明稳定性较好。

8.3 通过测定 10 批样品,结果延胡索乙素含量相差较大,故通过含量测定可有效地控制质量。

参考文献

1 沙世炎,徐礼燊,严敏如,等.中草药有效成分分析法.上

册.北京:人民卫生出版社,1985:53.

2 曾丽修.分光光度法测定颅痛定片剂的含量.药物分析杂志,1984,4(1):39.

3 朱敏.元胡类生物碱的高效薄层层析定量研究.药物分析杂志,1985,5(3):139.

4 傅小勇,梁文藻,涂国土.元胡生物碱的化学反应.药物分析杂志,1985,5(4):194.

5 杨晓平.旋光法测定罗痛定片剂的含量.药物分析杂志,1986,6(3):176.

6 庞志功,汪宝琪,黄泓.SLS-胶束荧光法测定元胡中延胡索乙素的含量.中国药科大学学报,1993,24(6):345.

收稿日期:1998-09-07